

Раціональний захист печінки

Артихол від «Київського вітамінного заводу» — єдиний в Україні препарат артишоку, що окрім звичайного дозування 200 мг, має дозування 400 мг, яке гарантує більшу прихильність пацієнтів до терапії

СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ АГЕНТ ВПЛИВУ

Артишок — рослина сімейства складноцвітих з лікарськими властивостями, що походить із Середземномор'я. Він має приємний смак завдяки наявності ефірних олій, «бере активну участь» у всіх середземноморських дієтах, оскільки добре засвоюється і рекомендований як замітник крохмалю при цукровому діабеті. Артишок вирізняється розмаїтим складом поживних речовин: містить вуглеводи (до 15%), білки (до 3%), жири (0,1%), солі кальцію і заліза, фосфати, вітаміни С, В₁, В₂, В₃, Р, каротин та інсулін, а також органічні кислоти — кофеїнову, хінну, хлоргенову, гліколеву і гліцерінову. Особливо цінні речовини — це біологічно активний глікозид цинарин і полісахарид інулін.

З арабської «артишок» означає як «вирваний із землі». У Єгипті, Стародавній Греції та Римі його використовували для лікування захворювань печінки та жовчного міхура, а також з метою очищення крові.

За результатами сучасних досліджень не лише були підтверджені вже відомі властивості артишоку (жовчогінна, гепатопротективна та сечогінна дії), але й визначені його додаткові характеристики (пребіотичні та метаболічні).

У багатьох дослідженнях доведено, що після застосування екстракту артишоку достовірно зменшується вираженість диспептичних симптомів і знижується рівень трансаміназ, холестерину, ліпопротеїнів низької щільності; покращується якість життя хворих з функціональною диспепсією; у пацієнтів з гіперхолестеринемією достовірно зменшується ендотеліальна дисфункція.

Артишок ефективно відновлює і підтримує в належному стані печінку, жовчний міхур і жовчовивідні шляхи; покращує роботу травного тракту при різнома-

нітних захворюваннях, у т.ч. при здутті живота, запорах, синдромі подразненого кишечника, утрудненому травленні важкої їжі. На основі артишоку виготовляються лікарські засоби, що застосовують при жовчнокам'яній і сечокам'яній хворобах, атеросклерозі, гепатиті, алергії різного походження, екземі та псоріазу. Також доведено, що артишок здатний послаблювати токсичний вплив на печінку деяких лікарських засобів.

Щодо протипоказань, то відома підвищена чутливість до артишоку та інших рослин родини складноцвітих. Також він протипоказаний при непрохідності жовчовивідних та сечовивідних шляхів, жовчнокам'яній хворобі і тяжкій печінковій недостатності.

На сьогодні в Європі препарати на основі артишоку виробляють понад 50 фармацевтичних компаній.

АРТИХОЛ: РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА КОМПЛАЙНС ПОЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ

Артихол випускається в двох формах: 200 мг № 30 та 400 мг № 40.

Одна таблетка Артихолу (виробник — «Київський вітамінний завод») містить сушого екстракту артишоку 200 мг або 400 мг. До складу екстракту артишоку входить комплекс біологічно активних речовин: цинарин, фенокислоти, біофлавоноїди, аскорбінова кислота, каротин, вітаміни В₁ та В₂, інулін.

Завдяки поєднанню біологічно активних речовин він чинить жовчогінну, гепатопротекторну та сечогінну дію, а також знижує вміст сечовини у крові. Інулін та інші складові, які містить артишок, покращують обмінні процеси в організмі.

Препарат призначений для використання при дискінезії жовчних шляхів за гіпотонічним типом, хронічному гепатиті, цирозі печінки, хронічному некалькульозному

холециститі, нирковій недостатності, хронічному нефриті.

На відміну від суто жовчогінних і гепатопротекторів, Артихол має комплексну дію (гепатотропну, жовчогінну і сечогінну), а отже, 1 таблетка цього препарату ефективно замінює прийом кількох інших препаратів одночасно, що особливо корисно у пацієнтів похилого віку, які зазвичай приймають велику кількість ліків. Отже, Артихол гарантує більшу безпеку пацієнтові та забезпечує раціональне використання ліків.

Звичайна рекомендована добова доза артишоку (для дорослих та дітей з 12 років — 1200 мг, для дітей від 6 до 12 років — 600 мг).

Артихол — єдиний препарат артишоку з дозуванням 400 мг, а це означає, що для отримання рекомендованої добової дози пацієнт може приймати лише 3 таблетки на день!

Водночас дві форми випуску лікарського засобу (200 мг для дітей і 400 мг для дорослих) надають можливість вибору з врахуванням віку хворого та призначеної дози.


Менша кількість таблеток на прийом раціоналізує терапію та гарантує більшу прихильність до терапії з боку пацієнта. Завдяки цьому ефективність терапії буде збережено.

Упаковка Артихолу 400 мг містить 40 таблеток, що дозволяє пацієнту лікуватися майже 2 тиж, що також збільшує прихильність пацієнтів до терапії Артихолом.

Доступна ціна, якість виробництва Артихолу, що гарантована багатьма чинниками (у т.ч. європейською субстанцією (Італія, Франція) та рівнем контролю якості ПАТ «Київський вітамінний завод»), гарантує очікуваний результат та підтримує імідж провізора та лікаря на високому рівні.

Артихол — раціонально захищає печінку!

Раціональний вибір у захисті печінки!



Незалежно від дози пацієнт приймає за добу лише 3 таблетки!*

* Інструкція медичного застосування препарату «Артіхол»

Коротка інструкція для медичного застосування:
Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить артишоку сухого екстракту 200 мг. Лікарська форма. Таблетки, вкриті оболонкою. Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів.

Показання для застосування:
Хронічний гепатит, цироз печінки, хронічний некалькульозний холецистит, дискінезія жовчних шляхів за гіпокінетичним типом, хронічний нефрит, хронічна ниркова недостатність.

Протипоказання. Відома підвищена чутливість до артишоку та інших рослин родини складноцвітих, непрохідність жовчовивідних та сечовідних шляхів, жовчокам'яна хвороба, тяжка печінкова недостатність. Належні заходи безпеки при застосуванні. Препарат застосовують з обережністю при захворюваннях, що можуть призвести до непрохідності жовчовивідних шляхів та при тяжких захворюваннях печінки. Препарат не застосовувати при гострих захворюваннях нирок. Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності або годування груддю препарат застосовують тільки за призначенням лікаря, якщо очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини. Спосіб застосування та дози. Внутрішньо дорослим і дітям старше 12 років призначають по 1-2 таблетки 3 рази на добу перед їдою. Дітям віком від 6 до 12 років призначають по 1 таблетці 3 рази на добу. Курс лікування — 2-3 тижні. При необхідності можливе проведення повторних курсів за узго-дженням з лікарем. Побічні ефекти. У разі тривалого застосування препарату у високих дозах можливі діарея, біль у верхній частині живота, нудота та печія, алергічні реакції. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Терапевтичний ефект антикоагулянтів кумаринового типу (наприклад, фенпрокумон, варфарин) може послаблюватися, що потребує корекції дози цих препаратів. Категорія відпуску. Без рецепта. З повною інформацією про препарат Ви можете ознайомитись в інструкції з медичного застосування.

