

Стопдіар®:

швидка допомога при діарейі

Коли починається діарея, навіть нагальні проблеми переходять до розряду другорядних, а першочерговими стають два питання: «Як скоріше добігти до туалету?» та «Як швидше припинити це неподобство?» Раптова діарея здатна підступно стати на заваді важливим справам, погіршити самопочуття і вплинути на здоров'я

ДІАРЕЯ НЕ ТЕРПИТЬ ЗВОЛІКАНЬ


При гострих кишкових інфекціях діарея виникає як захисна реакція організму, направлена на усунення шкідливих бактерій та їх токсинів. Неприємності, які виникають у разі проносу, полягають не тільки у катастрофічному зростанні частоти випорожнень, зневодненні організму та втраті мікроелементів. Діарея може супроводжуватись млявістю, слабкістю, підвищенням температури тіла, здуттям шлунка та відсутністю апетиту. Пронос може бути симптомом цілого ряду небезпечних захворювань. При діарейі бактеріального походження патогенні мікроорганізми витісняють нормальну мікрофлору травного тракту, що провокує розвиток додаткових хвороботворних бактерій. Пошкоджується слизова оболонка кишечника, порушується процес всмоктування та засвоєння життєво необхідних речовин. Якщо своєчасно не зупинити діарею, наслідки можуть призвести не тільки до тимчасових змін у повсякденному житті, але й зумовинити розвиток серйозних ускладнень.

НЕПРИЄМНІ НЕСПОДІВАНКИ

Святкові пікніки та дачний сезон приносять не тільки позитивні емоції, але й додають ложку дьогтю до бочки меду, підвищуючи ризики розладів шлунку та бактеріальних інфекцій. Світова практика лікування гострих кишкових інфекцій переконливо показує, що швидке одужання забезпечується дотриманням трьох основних принципів: регідратаційна та етіотропна терапія у поєднанні з лікувальною дієтою. На період лікування проносу необхідно повністю виключити алкоголь у будь-якій формі. Слід уникати вживання соків, свіжих овочів і фруктів, гострих і важких для травлення продуктів. При необхідності терапію проводять спільно із сольовим дієтичним харчуванням. Але коли неприємність у вигляді діарейі вже сталася, пацієнт потребує негайної допомоги і провізор мусить та може зарадити цьому лиху.

ЧОГО ХОЧУТЬ ПАЦІЄНТИ?

Пацієнти з діареєю вимагають від провізора негайного вирішення своєї проблеми. Засіб, якого вони потребують повинен швидко і ефективно зупинити пронос і при цьому не зашкодити організмові. Провізорів важливо пам'ятати, що більшості протидіарейних засобів не властива антибактеріальна активність. Такі препарати хоча і здатні тимчасово покращити стан пацієнта, але не впливають на причину захворювання. Проте для точного виявлення збудника інфекційного захворювання немає часу, оскільки пацієнт потребує



термінового припинення діарейі. Провізори можуть стати «добрими чарівниками» і допомогти пацієнтам насолоджуватись природою і при цьому швидко вирішити проблему раптової діарейі.

ГОТОВЕ РІШЕННЯ

Капсули Стопдіар виробництва компанії «Гедеон Ріхтер» є відмінним вибором для рекомендацій при інфекційній діарейі. Стопдіар — це зручний протидіарейний засіб, який прицільно і швидко діє на патогенну мікрофлору, дбайливо зберігаючи корисні мікроорганізми та не впливаючи системно на роботу шлунково-кишкового тракту. Результат дії Стопдіару настає вже в перші години після прийому. Потужна антибактеріальна дія препарату спрямована безпосередньо на причину діарейі. Діючою речовиною Стопдіару є кишковий антисептик ніфуроксазид, який протистоїть хвороботворному впливу більшості збудників кишкових інфекцій. При цьому не порушується нормальна мікрофлора травного тракту. Препарат добре переноситься і практично не має побічних ефектів. Він діє місцево, не всмоктується в кров і не має загальнотоксичних властивостей. Делікатна дія препарату не пригнічує перистальтику і не замикає інфекцію в кишечнику. Стопдіар має простий режим дозування завдяки зручній формі випуску у капсулах по 200 мг ніфуроксазиду. Препарат застосовують внутрішньо, запиваючи невеликою кількістю води, незалежно від прийому їжі. Дорослим достатньо однієї капсули 4 рази на добу. Для капсул не потрібні спеціальні умови зберігання, тому цей лікарський засіб зручно завжди мати при собі і використовувати у разі необхідності.

Стопдіар — це вірний вибір для усунення інфекційної діарейі. Вдячний пацієнт не забуде аптеку, де уважний провізор професійно порекомендував кращий засіб для швидкого, ефективного та делікатного припинення проносу!

Стопдіар

ніфуроксазид



Стопдіар — вірне рішення для усунення інфекційної діареї!

Капсули тверді 200 мг



- простий режим дозування
- висока прихильність до лікування

Коротка інструкція для медичного застосування препарату Стопдіар.

Склад: діюча речовина: 1 капсула містить ніфуроксазиду 200 мг; допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, крохмаль прежелатинізований, цукроза, магнію стеарат; капсула тверда: желатин, титану діоксид (Е 171), заліза оксид жовтий (Е 172). **Лікарська форма.** Капсули тверді. **Основні фізико-хімічні властивості:** капсули тверді, желатинові, циліндричні, жовтого кольору; розмір капсул – № 1. Гранулат, що міститься в капсулі, жовтого кольору. **Фармакотерапевтична група.** Антидіарейні препарати; засоби, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника. Протимікробні засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях. Код АТХ А07А Х03. **Показання.** Гостра діарея інфекційного генезу. **Протипоказання.** Гіперчутливість до ніфуроксазиду та до інших похідних нітрофурану або до будь-якої з допоміжних речовин. Діти до 7 років. **Спосіб застосування та дози.** Препарат застосовують внутрішньо, запиваючи невеликою кількістю води, незалежно від прийому їжі. Тривалість лікування – не більше 7 днів. Дорослі. 1 капсула 4 рази на добу (через кожні 6 годин). Діти віком від 7 років. 1 капсула 3 або 4 рази на добу (через кожні 6–8 годин). **Побічні реакції.** З боку кровоотвірної та лімфатичної системи: повідомлялося про один випадок гранулоцитопенії. З боку шлунково-кишкового тракту: індивідуальні реакції гіперчутливості до ніфуроксазиду. З боку шкіри та підшкірної сполучної тканини: рідко з'являються шкірні реакції у вигляді шкірного висипання, кропив'янки, набряку Квінке. **Упаковка.** 12 капсул твердих у блистері, 1 блистер у картонній упаковці. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** ТОВ «Гедеон Ріхтер Польща». **Р. н.** № UA14478/01/01 від 08.07.2015, Наказ МОЗ України № 418.

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників, призначена для розповсюдження на науково-практичних конференціях. Інформація наведена в скороченому вигляді. З повною інформацією про препарат можна ознайомитися в інструкції для медичного застосування препарату.



GEDEON RICHTER

Представництво «Ріхтер Гедеон Нрт» в Україні:
01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 17-Б.
Тел.: (044) 389-39-50, 389-39-51, тел./факс: 389-39-52,
e-mail: ukraine@richter.kiev.ua | www.richter.com.ua