

Ризатриптан: перша лінія терапії при мігрени

Нестерпний головний біль не тільки спричиняє страждання пацієнтів, але й здатен завдати непоправної шкоди їхньому здоров'ю. При виборі препарату для терапії мігрени необхідно ретельно зважити всі плюси та мінуси наявних лікувальних засобів. На жаль, анальгетики та інші НПЗЗ допомагають тільки при незначних проявах головного болю, і окрім того негативно впливають на шлунково-кишковий тракт. Для більш серйозних випадків мігрени слід шукати інші дієві засоби

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ БОЛЮ

Нерідко пацієнти припускаються типової помилки, застосовуючи знеболювальні засоби для усунення мігрени. Це може дати тільки тимчасове полегшення, бо невдовзі біль повертається, а в окремих випадках анальгетики тільки погіршують стан хворого. Європейська федерація з вивчення головного болю рекомендує триптани як препарати першої лінії терапії при виражених та помірних симптомах мігрени [1]. Триптани — це група лікарських засобів, спеціально розроблених для усунення нападів мігрени. Вони ефективні у будь-якій фазі нападу, проте найвиразніша дія досягається у разі застосування на початковій стадії мігренозної атаки. Для невідкладної терапії різних фаз головного болю при нападах мігрени, з аурию або без такої спеціалісти рекомендують ризатриптан. Його застосовують також у випадку, коли попередня терапія анальгетиками або іншими НПЗЗ виявилася недостатньо ефективною.



ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Ризатриптан слід призначати тільки тим пацієнтам, яким після консультації з лікарем було встановлено діагноз мігрени. Дані досліджень переконливо довели, що пацієнтів, задоволених результатами застосування триптанів, значно більше (83,1%), ніж тих, хто приймав інші препарати (32,2%)

[4]. Після перорального застосування ризатриптан швидко і повністю абсорбується. Пікова концентрація в плазмі крові досягається приблизно через 1–1,5 год. Ризатриптан швидко позбавляє від головного болю, адже його дія починається через 30 хв, у порівнянні з іншими триптанами, ефект яких спостерігається через 45–60 хв [2]. При одночасному прийомі з їжею абсорбція ризатриптану затримується приблизно на 1 год. Навіть при застосуванні препарату в максимальній дозі в плазмі крові не відбувається його накопичення. Пацієнти в цілому добре переносять ризатриптан. При цьому можна уникнути прийому додаткових знеболювальних засобів. Застосування ризатриптану дозволяє швидко повернутися до повсякденної соціальної професійної активності та виконання сімейних справ.

ДІЯ НА ВСІ ЛАНКИ ПАТОГЕНЕЗУ

Триптани ефективно впливають на всі основні ланки патогенезу мігрени [2]. Механізм дії триптанів ґрунтується на:

- здатності з'єднуватися з рецепторами судинної стінки, викликаючи звуження мозкових судин;
- здатності блокувати виникнення болю на рівні рецепторів трійчастого нерва, що забезпечує іннервацію голови і обличчя;
- вмінню впливати і на інші симптоми мігрени — нудоту, блювання, світло- і звукобоязні [3].

Ризатриптан забезпечує покращення загального стану та приносить полегшення пацієнту, знесиленому виснажливими нападами мігрени.

ЛІТЕРАТУРА

1. Steiner T.J. et al. European Headache Federation; Lifting the Burden: The Global Campaign to Reduce the Burden of Headache disorders in primary care. J Headache pain. 2007; 8 Suppl 1: S3–47.
2. Evers S. et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine — revised report of an EFNS task force. European Journal of Neurology 2009, 16: 968–981.
3. Бордюлюк А.А. Таблетки от мигрени: список и характеристики//doctor-neurologist.ru
4. Lanteri-Minet M., Massiou H., Romatet, S., Barberi A., Lucas C., Allaf B. An Instrument to Assess Patient Perceptions of Satisfaction With Acute Migraine Treatment (EXPERT Study). Headache 2011; 51: 590–601.

RIZO-PUB-062017-017

РІЗОПТАН®

риза триптан



Швидко та ефективно позбавляє від нападу мігрени¹⁻³

- Доведена біоеквівалентність оригінальному ризатриптану⁴
- Один з найдоступніших за ціною ризатриптанів в Україні⁵



Сверчена інструкція для медичного застосування лікарського засобу РІЗОПТАН®. Діюча речовина: ризатриптан; 1 таблетка містить ризатриптану бензоату 14,53 мг у порівнянні з ризатриптаном 10 мг. Лікарська форма. Таблетки. Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовують при мігрени. Селективні агоністи 5-HT₁-рецепторів серотоніну. Ризатриптан. Код АТХ N02СС04. Фармакологічні властивості. Ризатриптан селективно з високою афінітністю зв'язується з рецепторами людини 5-HT_{1B}/5-HT_{1D}. Тератогенна активність ризатриптану при лікуванні мігренного болю майже бути повною його адекватними дозами на рецепторах 5-HT_{1B} та 5-HT_{1D} екстрацеребральних інтратеріальних кровоносних судин, не, не вважається, розширюється під час нападу; іррадіації спостерігаються, не існують. Як. Активація рецепторів 5-HT_{1B} та 5-HT_{1D} може призвести до звуження інтратеріальних кровоносних судин, які викликають біль, і інтенсивне звуження нейропептиду, що веде до зменшення запаленої чутливої тканини і зменшення передачі центрального тригеміального болювого сигналу. Показання. Невідкладна терапія фазі головного болю при нападах мігрени, з аурию або без. Протипозакання. Гіперчутливість до ризатриптану або будь-якої допоміжної речовини. Одночасне застосування з інгібіторами моноаміноксидаз (МАО) або застосування протягом двох тижнів з моменту припинення лікування інгібіторами МАО. Також печінкова або ниркова недостатність. Порухливі захворювання серцево-судинної системи, в тому числі: ішемічна хвороба серця (стенокардія, інфаркт міокарда в анамнезі) або зафіксована безсимптомна ішемія), ознаки та симптоми ішемічної хвороби серця або стенокардії Принцметала. Захворювання периферичних кровоносних судин. Одночасне застосування ризатриптану і ерготаміну, похідних алкалоїдів різними (включачи метилергі) або інших агоністів рецепторів 5-HT_{1B/1D}. Фізіологічні ознаки. Бесновий, запалювальний, сенсибілізуючий, паросистів, головний біль, гіперестезія, зменшення рухової активності, сонливість, припадки, дискомфорт у горлі, нудота, сухість у роті, блювання, діарея, диспепсія, почервоніння, відсутня толерантність, астенія/втома, біль у животі або грудях (розподі сорочкою, до детальної інформації див. інструкція для медичного застосування). Категорія відпуску. За рецептом. Р. П. М. З. Україна: НПУА/15160/01/01, Назва М. З. України від 18.05.2016 №453. Виробник: ТОВ «Фарма Сістем», Україна, 03124, м. Київ, Суляків 1, Леско, 8. ТОВ «Фарма Сістем» входить до групи компаній Асіно (Швейцарія). Повна інформація знаходиться в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розширення в спеціалізованих відділеннях для медичного установа та лікарів, і для розширення на сайтах, конференціях, симпозиумах з медичної тематикою. 1. Miguel J. ALáinez. Rizatriptan in the treatment of migraine. Neuroepidemiol Dis Treat. 2006 Sep; 2(3): 247–259. 2. Becker W.J. Acute Migraine Treatment in Adults. Headache. 2015 Jun; 55(6):778–93. 3. Evers S. et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine — revised report of an EFNS task force. European Journal of Neurology 2009; 16: 968–981. 4. Bioequivalence Study code RIZ-ES-2015-06, Clin. Report Jan. 2015, Summary 46 p. S. Жовтень «Асіно», www.acino.ch. 5. Р. П. М. З. Україна: НПУА/15160/01/01, Назва М. З. України від 18.05.2016 №453.