

ЛАНДШАФТНІ ГЕОІНДИКАТОРИ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗРIVНИХ ПОРУШЕНЬ ЯК ОСНОВА ЇХ ВИВЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ

2. ГЕОДИНАМІЧНІ ОЗНАКИ ДИЗ'ЮНКТИВНИХ СТРУКТУР

© О.Т. Азімов, 2009

Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна

For the conditions of the platform areas there are characterised the basic landscape features of the discriminating geodynamic fields at the recent tectogenesis stage. The fields are related to the Earth's crust disjunctive structures. Peculiarities of the fields' reflection in the remote sensing data are described too.

Актуальність роботи. Диз'юнктивні дислокації належать до структур земної кори, поширення яких спостерігається повсюдно, незалежно від геотектонічної позиції того чи іншого регіону. У переважній більшості вони визначали і продовжують впливати на розвиток геологічної будови цих регіонів, просторово-генетично контролюють розміщення в їхніх межах низки корисних копалин, є одним з чинників формування їх сейсмо- і неотектонічної активності. Тому всебічне пізнання розривних утворень було і залишається важливим науково-прикладним завданням у геології.

До складу інформативних й ефективних методів вивчення і картування диз'юнктивних дислокаций, що є одним з основних напрямів досліджень загальної та регіональної геології, геотектоніки, вже традиційно належать аерокосмогеологічні. Вони ґрунтуються на застосуванні різноманітних даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), спектр технічних характеристик і потенційних можливостей яких з року в рік розширяється. Таким чином, постає потреба удосконалення відповідних методичних способів дешифрування і геологічної інтерпретації матеріалів аерокосмічних зйомок (МАКЗ), системно-аналітичного узагальнення теоретичних засад і розробки методологічних основ вивчення характерних особливостей розривних деформацій земної кори за даними ДЗЗ, які логічно б ґрунтуються на останніх досягненнях у різних галузях природознавства (математиці, фізиці, хімії, біології, геології в широкому їх розумінні), а також новітніх геоінформаційних технологій. Це засвідчує зв'язок указаного завдання як з **фундаментальними проблемами сучасної науки**, так і з **практичною стороною впровадження** результатів його вирішення у процес надркористування і моніторингу навколошнього природного середовища.

Разом з тим, як ми зазначали у першій статті [1] цього циклу праць, загалом теорія і методоло-

гія розрізnenня диз'юнктивних структур за кінематичними і геодинамічними ознаками, ступенем розкритості для міграції різноманітних флюїдів на основі використання матеріалів дистанційних зйомок (МДЗ), структурно-геоморфологічних і неотектонічних досліджень та проблемно орієнтованої інтерпретації отриманих результатів досить повною мірою **не розроблені**. Всі існуючі подібні методики є здебільшого частковими, обґрутованими для окремих, переважно гірськоскладчастих зон з "відкритою" геологією. Крім того, рівень застосування комп'ютерних технологій обробки залучених даних ДЗЗ, геоінформаційного та математичного моделювання у процесі вирішення цієї важливої **актуальної наукової проблеми** незначний. Analogічної думки дотримуються й інші фахівці [2–4 та ін.].

Отже, окреслені завдання є частиною загальної проблеми. Вони потребують свого розв'язання у майбутньому. Щодо їх вирішення ця робота методичного аспекту є одним з наукових впроваджень стосовно ландшафтно-геодинамічних умов платформної частини території України на принципі системності.

Методологічна основа роботи. Стосовно загальної теорії диз'юнктивів **принцип системності** потребує виконання під час досліджень деяких положень [5]. По-перше, визначаємо, що являє собою диз'юнктив як цілісне утворення, зокрема: як він межує з геологічними об'єктами, виявляється чи ні у сучасному ландшафті, а також на МАКЗ.

По-друге, встановлюємо елементи й суттєві компоненти диз'юнктиву. Наприклад, зазначаємо, що диз'юнктив є системою розривних порушень вищого рангу або як геологічне тіло складається з деяких інших геологічних утворень. У кожному з компонентів ландшафту земної поверхні слід виділяти різнопорядкові елементи, що індіцирують дислокації відповідних рангів і

відображаються на даних ДЗЗ. Загалом це характеризує об'єкт досліджень з різних боків.

По-третє, слід показувати, що є надсистемою для діз'юнктиву будь-якого порядку і як тектонічні порушення групуються в цю надсистему, установлювати зв'язки між ними (тобто показувати структуру надсистеми). Оскільки діз'юнктиви можуть входити як частини в різні геологічні системи, необхідно показувати подібність або відмінність їх входження у системи.

Крім переліченого, принцип системності вимагає виявлення та описання специфічних системних властивостей об'єктів досліджень. Щодо головного завдання наших досліджень – це насамперед особливості структури, морфокінематики і молодої та сучасної геодинаміки розривних порушень, а також пов'язаних з ними тектонічних напружень і плікативних утворень, відповідних аномалій в будові ландшафту Землі та на МДЗ.

Отже, дотримуючись принципу системності, ми розглядаємо *різні глибинні рівні прояву* (або рівневі поверхні прояву) кінематичних і геодинамічних ознак об'єктів діз'юнктивного походження *різного рангу*: 1) у земних надрах (геологічні структури і процеси); 2) у сучасному ландшафті земної поверхні, 3) на даних ДЗЗ.

Відповідно до [6, 7], під *сучасними рухами земної кори* розуміємо рухи, що відбуваються на поверхні Землі та в її надрах нині й останні кілька сотень років (100–200 років, на думку авторів праці [8], – 300 років), відколи почалося свідоме їх вивчення і вимірювання, зокрема інструментальними, геодезичними, методами. *Молодими* називаємо рухи земної кори і деформації гірських порід, які відбувалися в інтервалі від перших сотень і приблизно до 10–12 тис. років, тобто ці рухи охоплюють не лише післялььодовиковий, а й пізньолььодовиковий період, що виходить за межі часового інтервалу голоцену [9]. Молоді рухи вивчають насамперед геолого-геоморфологічними методами.

Неотектонічні (новітні) рухи відповідають тектонічному етапу новітньої активізації Землі протягом 35–40 млн років, який включає всі передлічені вище рухи і структурні перетворення [9]. Для їх вивчення застосовують комплексні методи.

У статті [1] циклу наголошено, що виявлення кінематичних умов формування розривних порушень фундаменту та осадового чохла за допомогою аналізу структурного стилю потребує вивчення передусім особливостей розвитку в їхніх межах первинної деформованості, її орієнтування, розподілу мікро- і макротріщинуватості тощо. Аналогічні дослідження слід виконувати у процесі з'ясування геодинамічних умов виникнення і розвитку діз'юнктивів.

До *геодинамічних умов*, згідно з [10], ми відносимо сукупність глибинних і поверхневих геоло-

гічних процесів (магматичних, седиментологічних, структуроутворювальних тощо), зумовлених латеральними і вертикальними рухами тектонічних блоків, потоків речовини та енергії в умовах просторово розподілених силових полів різного ієрархічного рівня. Під *блоками*, відповідно до [28 та ін.], розуміємо обмежені з усіх боків діз'юнктивами ділянки земної кори, що характеризуються певною єдністю будови, зумовленою єдиною історією їхнього формування, самостійністю тенденцій і темпів тектонічних рухів на фоні загального розвитку більших елементів літосфери.

Щоб мати уявлення про специфічні характеристики насамперед ідеалізованих розривних деформацій різного ієрархічного рівня нами в статті [11] подано аналіз опублікованих вітчизняних і закордонних *даних теоретичних розробок* (Г.М. Каттерфельд, І.І. Чебаненко, О.В. Долицький, М. Чіннері, М.П. Єсіков, М. Зобек та ін.) і результатів *експериментальних тектонофізичних досліджень модельних порушень* (М.В. Гзовський, С.С. Стоянов, Д.Н. Осокіна, С.О. Борняков, С.І. Шерман та ін.). Вони не суперечать друкованим і архівним матеріалам практичних геологорозвідувальних робіт по регіонах як України, так й інших держав і враховані нами під час вивчення платформних структур (на прикладі регіонів Українського щита – УЩ, і Дніпровсько-Донецької западини – ДДЗ). Разом з матеріалами щодо практичної геології та структурної геоморфології вказані дані стали основою обґрунтування теоретико-методичних зasad диференціації діз'юнктивних дислокацій за морфокінематичними і геодинамічними ознаками діз'юнктивів.

При цьому інформація про особливості деформаційних процесів, яка стосується поверхневих частин модельних матеріалів, за аналогією поширення нами на приповерхневі ділянки геологічного розрізу, тобто ті ділянки, які передовсім вивчаються аерокосмічними технологіями і дані щодо яких індицирують специфіку структур глибокозанурених шарів. Важливими при цьому є врахування, аналіз і характеристика закономірностей внутрішньої будови зон аномального геодинамічного впливу (ЗАГДВ) модельних розривів, оскільки ці параметри по можливості мають бути визначеніми протягом виявлення та дослідження аерокосмічними методами природних об'єктів діз'юнктивного генезису, насамперед еталонних у межах завіркових полігонів, а потім маловивчених або виділених уперше. Тут, відповідно до праці [8], під *ЗАГДВ розривного порушення* ми розуміємо зону, в межах якої гірські породи зазнають механічних, петрографічних, структурних змін у зв'язку з формуванням і “життям” цього порушення.

Мета та завдання статті. У першій статті [1] циклу розглянуто геоіндикатори морфокінематич-

них ознак розривних порушень, що здебільшого властиві платформним ділянкам земної кори. **Метою цієї статті** є характеристика геоіндикаційного відображення у структурі компонентів ландшафту земної поверхні відмінних за своєю дією полів геодинамічних напружень на молодому і сучасному етапах тектогенезу, пов'язаних з різнопорядковими диз'юнктивами. Це є основою подальшого виявлення цих порушень на основі аналізу дешифрувальних ознак за МДЗ.

Для досягнення мети у статті послідовно розв'язуємо низку завдань. **Перше** полягає передусім у комплексному застосуванні відповідних результатів геолого-геофізичних досліджень структури земної кори за системним підходом. Зокрема, найперше звертаємо увагу на відмінності розподілу у природі основних груп розривних дислокацій і просторово спряжених з ними геологічних об'єктів різних генетичних і морфологічних типів та різноманітних процесів у субстраті залежно від головних тектонічних умов або типів механічного впливу на гірські породи, земну кору загалом, в яких ці диз'юнктивні структури зароджуються і розвиваються, а саме під переважною дією напружень розтягнення, стиснення або зсуву (в механічному розумінні). При цьому за основу взято генетичну класифікацію розривних порушень, викладену у праці [12]. Такі типи деформацій, як кручення й згин, ретельно не аналізуємо. Обумовимо також, що на цьому етапі дослідження виконані нами без диференціації геологічних структур і процесів залежно від різних регіональних геотектонічних утворень платформних зон (щит, авлакоген тощо).

Дотримуючись принципу системності, ми розглядаємо лише зональний і локальний масштабні рівні геотектонічних умов, характерних для них диз'юнктивних дислокацій та їхніх структурних асоціацій, а також відповідні ландшафтні індикатори природно-геологічних умов платформної, переважно "закритої" частини території України або інших регіонів з подібною будовою. Застережемо також, що ці індикатори аналізуємо без розрізнення щодо ландшафтних зон (полісся, лісостеп, степ). Це є **другим** завданням статті.

Ландшафтні критерії ідентифікації полів деформацій органічно доповнено загалом просторово збіжними з ними ознаками за даними ДЗЗ. Останні, маючи здатність охоплювати значні за площею території і просторово поєднувати в їх межах у радіометричному полі знімків різноманітні геоіндикатори зонального й локального порядку, дають змогу простежувати також регіональні за рангом зони геодинамічних напружень. Визначення дистанційних ознак є **третім** завданням статті.

Новизна пропонованого дослідження. Аналіз широкого кола класичних і новітніх наукових

праць, які містять матеріали з практичної геології стосовно тектонічно по-різному побудованих регіонів Землі [2, 3, 8, 10, 12–40 та ін.], урахування результатів власних досліджень [41–55 та ін.] дають змогу класифікувати **складчасті й диз'юнктивні структури земної кори** зонального і локального ієархічного рівня, а також пов'язані з ними геологічні процеси відповідно до типів механічних деформацій, під домінуючою перманентною дією яких вони формуються. Отже, загалом у **полях напружень** переважного **розтягнення** кори поверхні певних ділянок опускаються, в їхніх межах виникають і розвиваються більшою мірою негативні структурні форми відповідного рангу (типу грабенів, грабен-синкліналей, западин, прогинів, синкліналей, концентричних комплексів, флексур тощо), що в умовах дії сили земного тяжіння цілком відповідає законам теоретичної механіки, а також формуються розривні дислокації розтягнення, що кінематично виражені розсуви, скидами, комбінованими зсуво-розсуви, зсуво-скидами та скидо-зсувами тощо (див. таблицю). При цьому диз'юнктиви домінують над плікативними утвореннями.

Натомість для умов інтенсивного геодинамічного **стиснення** характерні відповідні за порядком позитивні плікативно-диз'юнктивні структури: виступи, горсти, горст-антікліналі, підняття, антікліналі, підкиди, антетичні скиди, насуви, покриви, елементарні горизонтальні зсуви, комбіновані форми зсуво-підкидів, зсуво-насувів і насуво-зсувів тощо (див. таблицю).

Деформації **зсуву** характеризуються специфічними структурними ансамблями, створеними за закономірно розміщеними по площі об'єктами, що відображають зони розтягнення і стиснення вищого рангу. Їм присвячено чимало спеціальних робіт [8, 13–18 та ін.], аналіз яких дає можливість зробити висновок, що у полях напружень зсуву на етапі розвитку звичних дислокацій до утворення диз'юнктивних порушень формуються відповідні їм за масштабами вертикальні та горизонтальні флексури, а на етапі виникнення розривних зміщень – зсуви, підкидо-зсуви, зсуво-підкиди, підкиди, насуви, шар'яжі (для гірсько-складчастих зон), трансформні диз'юнктиви (деформації перерізування або зрізу).

Ландшафтні геоіндикатори переважної більшості вказаних розривних дислокаций різної кінематики охарактеризовано у статті [1]. На наш погляд, узагальнення викладеного дає аргументовані підстави стверджувати, що зв'язок між напруженним станом земної кори і **геоморфологічними умовами**, специфічними морфокінематичними формами рельєфу земної поверхні виявляється здебільшого у приуроченості негативних форм рельєфу до відповідних за масштабами зон новітнього та сучасного розтягу, а позитивних форм –

Класифікація індикаторів, що відображають поля відмінних геодинамічних напружень земної кори (для ландшафтно-геологічних умов платформої частини території України)

Групи індикаторів для зон переважного розвитку напружень		
Рівнівий прояв	розташування	списнення
У геологічному субстраті (структурі)	<i>Зональний і локальний рівні</i>	<p>Виступи, горсти, горст-антіклиналі, підняття, антикліналі, флексури. Підкіди (зокрема лістричі), антитетні скиди, насуви, давні паш'ї, прості елементарні горизонтальні зсуви, комбіновані форми зсуво-підкідів, підкідо-зсувів, зуко-насуви і насуво-зсуви</p>
У компонентах сучасного ландшафту земної поверхні (геоіндикатори)		<p>Позитивні форми рельєфу (часто спрямлені): вододіли, ерозійно-денудаційні останці, відособлені підвищення, горби (зокрема пішані), пасма, дюни, озя, кінцево-моренні формування, замкнені вигнуті височини або виступи, системи дугоподібних форм рельєфу з асиметричною будовою, звикисті уступи (зокрема такі, що мають неправильну форму у плані) тощо, а також спряженні з ними негативні форми рельєфу (задбільшого ерозійного генезису): яри, балки, тальвети долин, в яких видутні ерозійні уступи, схили тектонічного походження (всі вони підкреслюються підграфічною мережею, яка просторово з ними збігається); звужені ділянки русел річок та іхніх долинних комплексів, що характеризуються фуркаллями русел, збільшеннем урізів, уступами та обривами, диференціацією заплав, більшото дренованістю поверхні долин, спрямленнями коліноподібними простяганнями, зміщеннями русел і проток, поглибленими стариць, наявністю водоріян тощо; площове хаотичне поширення мікроzapадин на низких геоморфологічних рівнях тощо. Зазвичай ділянки зі зниженою зволоженістю поверхневих утворень. Інтенсивна площаща ерозія поверхневих віджайдів, зростання частки піщаних літофагій, суглінків у ґрунтах. Часто просторово ділянки поширення відносно сухостепової рослинності закономірно взаємоперемежуються з осередками розвитку вологогібридних асоціацій</p>
На даних ДЗЗ (лінійні ознаки)		<p><i>Регіональний зональний і локальний рівні</i></p> <p>Аномальний (світліший) фототон зображення на МДЗ порівняно із суміжними ділянками. Системи дугоподібних і фестончастих (іноді загатоподібних) у плані ліній, прямі та слабо винуті лініаменти (зебельшого дещо розриватися невеликі лінійні об'єкти) або ж іхні зони різної ширини, що супроводжуються операціям локальних лініаментів типу "кінського хвоста". Переважний розвиток невеликих (коротких) лініаментів значної щільності за площею. Нерідко ромбочні (або паралелограмні), лінізподібні у плані блоки, що утворюють ланцюжки або рої, довгі осі яких можуть приблизно вказувати на напрямок максимальних дотичних напружень, а короткі – одного з головних нормальних</p>

до зон залишково-тангенційного стиснення (див. таблицю). Подібної точки зору дотримуються й інші дослідники [2, 3 та ін.]. Така закономірність цілком узгоджується з особливостями структуроформування в різних динамічних умовах протягом геосторичного часу (принцип актуалізму), що не викликає заперечень з позиції механіки.

Таким чином, до площ з від'ємними знаками неотектонічних рухів, що зазнають зонального і локального геодинамічного переважного *розтягнення*, нами заражовано розлогі улоговини в рельєфі з привнесенням матеріалу, заболочені зниження, болота і т. п.; плоскі середні й велики знижені ізометричні поверхні (іноді озерно-льодовикового походження) з доцентровим напрямком водотоків, практично безстічними (або з дуже слабким уклоном) поверхнями зі слабкою дренованістю, які, переважно, заболочені, тощо (див. таблицю). Крім них до площ, що індизиують від'ємні рухи і знижені блоки, також належать ті, в межах яких яри та улоговини мають нечітко виражений поперечний профіль, їхні схили є пологими, донного врізу в них немає, їхні днища заболочені (передусім це спостерігається на низьких рівнях денудаційних рівнин і на давньоаллювіальних терасових поверхнях). Площове хаотичне (бесистемне) поширення мікрознижень (мікrozападин) на високих геоморфологічних рівнях більшою мірою фіксує односпрямоване опускання відповідного блока.

Річкові заплави, долинні комплекси загалом найяскравіше демонструють залежність від геоструктурних особливостей території. Ширина і рельєф заплав, літологічний склад алювіальних відкладів, умови зваження залежать від того, структуру якого знака перетинає ріка. Аналізуючи заплаву (долину), в дослідженнях ми не стільки враховували позитивні чи негативні форми рельєфу і щільність їх поширення, скільки вивчали плановий рисунок, морфологію і генезис окремих форм, особливо ерозійних. Адже заплава і русло – це молоді утворення, які досить чутливо реагують на неотектонічні рухи і глибинну будову району. Так, від'ємні за знаком неотектонічні рухи зумовлюють розширення долинного комплексу, уповільнення течії, сильне меандрування русла, заболоченість заплави. Тут формуються сегментно-гравісті заплави і вирівняні плоскі поверхні низького рівня.

Натомість на позитивних структурах, що здебільшого охоплені дією напружень локального геодинамічного *стиснення*, звужені ділянки річкових долин характеризуються фуркацією русла, збільшенням урізу, уступами та обривами, диференціацією заплави, більшою дренованістю поверхні долини, спрямленими, коліноподібними простяганнями, зміщеннями русла і проток одного напрямку, поглибленим стариць, наявністю

водороїн (глибинна ерозія в руслах). Мікрозниження з хаотичним поширенням за площею в межах низьких геоморфологічних рівнів щонайшвидше також указують на додатні односпрямовані рухи (див. таблицю).

Для площ, що перебувають під дією переважного зонального і локального стиснення, характерні позитивні форми рельєфу земної поверхні: вододіли, ерозійно-денудаційні останці, відособлені підвищення, горби (зокрема піщані), пасма, дюни, ози, кінцево-моренні формування, які часто є спрямленими, а також замкнені витягнуті височини або виступи, системи дугоподібних форм рельєфу з асиметричною будовою, звивисті уступи (зокрема, неправильної у плані форми) тощо (див. таблицю). Зазвичай ці форми на місцевості спряженні з негативними формами рельєфу (здебільшого ерозійного генезису). Серед них яри, балки, тальвеги долин, в яких відсутні ерозійні врізи, ерозійні уступи, схили тектонічного походження. Всі вони підкresлюються гідрографічною мережею, яка просторово з ними збігається.

Разом з тим слід брати до уваги факт створення умов розтягнення верхніх зон земної кори, зокрема її поверхні, на ділянках тектонічних підняття (особливо локальних) під час висхідних неотектонічних рухів, що загалом характеризують умови геодинамічного стиснення. Зазвичай в таких випадках зони розтягнення мають локальне вираження й облямовують по периферії ділянки підняття, індизиуються відповідними ознаками в орогідрографії, інших компонентах ландшафту, тобто спостерігається просторовий парагенез дії різноспрямованих тектонічних напружень. Таким чином, коректне розшифрування за ландшафтними особливостями площ переважного розвитку деформацій стиснення або розтягнення потребує системно-ієрархічного підходу, вдумливого аналізу. Все це потрібно враховувати із залученням у процес досліджень даних ДЗЗ.

Умови геодинамічного зсуву (в механічному сенсі) індизиуються, якщо є приблизно однакова кількість геоморфологічних ознак напружень розтягнення і стиснення. Зокрема, в роботах [2, 3] зазначено, що таке можливе, якщо відношення кількості індикаторів узказаних груп не перевищує 1,2. На наш погляд, цей показник може мати більші значення (забігаючи наперед, відзначимо, що не лише для геоморфологічних, а й для інших ландшафтних ознак). Проте це питання потребує подальшого вивчення, найперше на прикладі статистично більшої кількості еталонних природних структур.

Разом з тим геоморфологічні ознаки синергетично підсилюються *іншими геоіндикаторами*, які просторово з ними збігаються: гідрографічною мережею, підвищеною зволоженістю (притаманніші для зон, що здебільшого зазнають де-

формацій розтягнення), показниками поверхневих відкладів і ґрунтів (зростання частки піщаних літофаций, суглинків у ґрунтах – для зон стиснення; збільшення товщини гумусного шару, вмісту власне гумусу, плошове заболочування – для зон розтягнення), рослинності (переважання вологолюбних асоціацій – для зон розтягнення) (див. таблицю). Таким чином, ландшафтні індикатори розривних порушень відображають насамперед характер динамічних напружень, які пов’язані з інтенсивністю і спрямованістю новітніх і сучасних тектонічних деформацій в ЗАГДВ цих структур.

Ще Л.М. Розанов в [56] відзначав провідну роль у формуванні фототону і рисунку на космічних знімках новітньої тектонічної активізації та пов’язаних з нею процесів зволоження земної поверхні. На цій підставі був намічений підхід до геологічного дешифрування МДЗ, названий геодинамічним. Певний приріст корисної інформації щодо геодинамічних умов і, що особливо суттєво, контурів плош їхнього поширення на великій території дає аналіз за даними ДЗЗ не лише природно-територіальних комплексів (ПТК) за геометричними і фотометричними ознаками загалом, а й комплексу різноманітних геоіндикаторів у компонентах ландшафту зокрема.

Враховуючи, що характерною рисою більшої частини території України є невисокий рівень збереженості природних ландшафтів, основним об’єктом дистанційних досліджень мають бути компоненти ландшафту, які найменше зазнали антропогенного перетворення, відносно стабільні в часі протягом року і разом з тим є достатньо фізіономічними та геологічно інформативними. Здебільшого це рельєф і рельєфоутворюальні процеси. Найвиразніші вони у заплавах річок, у межах перших надзаплавних терас, ерозійно-денудаційної мережі, заболочених ділянок вододілів, лісових масивів природного походження тощо, оскільки значною мірою залишилися поза господарської діяльності людини. Загалом у межах подібних ділянок є можливість враховувати переважну більшість компонентів земного ландшафту.

При цьому дуже важливою, принциповою і необхідною умовою аналізу особливостей ландшафту земної поверхні є умова не зосереджуватися на якомусь одному його компоненті, обмежуючись лише ним і тим самим абстрагуючись від інших компонентів, а вивчати загальноландшафтну вираженість складових структур земної кори. Навіть під час аналізу однієї з груп дешифрувальних ознак (на першому етапі досліджень), наприклад геоморфологічних, потрібно звертати увагу не лише на їхні геометричні форми (прямолінійні, дугоподібні, кільцеві тощо), а й на конкретну морфокінематичну вираженість. Завдяки такому підходу можна отримати суттєвіший

приріст різнопланової інформації, зокрема про кінематичну належність диз’юнктивів, відносну спрямованість та інтенсивність молодих і сучасних тектонічних рухів у межах ЗАГДВ цих геологічних об’єктів.

Зокрема, прямолінійні фрагменти лінеаментів **на МДЗ** нерідко відповідають розломам і розривам скидо-підкідового і зсувного типів зі значними амплітудами вертикальних переміщень. Вони простежуються у відносно вузьких за ширину зонах (наприклад, для утворень III порядку – 1,0–1,5 і 3–5 км відповідно). При цьому умови геотектонічного *розтягнення* різного масштабного рівня (регіонального, зонального, локального), в яких часто розвиваються скиди, на МАКЗ часто визначаються за відповідними за рангами тектонічними уступами в рельєфі земної поверхні, уздовж яких виявляються річки та їхні долинні комплекси, підгачені озера, ділянки заболочування, перевозлення, що здебільшого відзначаються темнішим фототоном дистанційних зображень. Лінеаменти, за якими вони дешифруються, зазвичай великі (довгі), відносно рідко розміщуються за площею (див. таблицю).

Натомість в умовах геодинамічного *стиснення* розвиваються підкіди, насуви, а в умовах геосинклінального етапу розвитку – і покривно-лускоподібні складчасті споруди. У разі їх успадкованості на неотектонічному етапі, деякої ремобілізації на даних ДЗЗ навіть у платформних частинах земної кори вони проявляються сумірними полям напружень об’єктами з притаманними їм дугоподібними та фестончастими у плані обрисами. Ширина їх виявлення у кілька разів більша за ширину зон простеження лінеаментів того самого рангу (від 4–6 до 10–12 км для утворень III порядку). При цьому власне лінійні структури є невеликими (короткими), а плоштовий їх розподіл відносно щільний. Разом з тим у межах блоків земної кори, які прилягають до зон стиснення, формуються і розвиваються складні мозаїчні системи зсувів, які добре дешифруються на МАКЗ за описаними вище ознаками (див. таблицю).

Отже, різноманітні геологічні структури (зокрема, розривні порушення), їхні неотектонічні параметри та особливості відображення в сучасному ландшафті Землі є результатом інтерференції процесів і взаємодії об’єктів, що мають різні ранги, тип генезису, глибину закладення, вік, спрямованість й тривалість дії. Для адекватнішої інтерпретації кінематично-геодинамічних умов неотектонічного розвитку диз’юнктивів певного масштабного рівня виділення і картування відмінних елементів різних геоіндикаційно інформативних компонентів сучасного ландшафту земної поверхні відповідного порядку (наприклад, негативні–позитивні форми рельєфу, перевозлення–збезводнювання і заболочування–опішанювання поверх-

невих відкладів, гірофільна–сухостійка рослинність тощо) на першому етапі потрібно здійснювати диференційовано, з розрізнянням картографічними знаками.

Так, у процесі комп’ютеризованого тематичного (наприклад структурного) дешифрування МДЗ та інших даних для кожної з груп лініаментів і кільцевих структур (дуготипів), виділених за відмінними геоморфологічними, ґрунто-геоботанічними ознаками, ПТК загалом, складаємо окремий (автономний) векторизований шар. У результаті кожен з цих шарів представляємо окремою картосхемою. У подальшому слід проводити комплексний аналіз просторового взаємовідношення виявленіх об’єктів, а також їх співвідношення з відомими різноманітними структурами земної кори, зокрема розривними порушеннями за апріорними геолого-геофізичними даними.

Висновки. Чимала цінність МАКЗ полягає в тому, що виявлення за ними на великих територіях диз’юнктивів різноманітних морфокінематичних типів і порядків, а також зміщень за ними і характерних для них геоіндикаторів сучасного ландшафту земної поверхні дає змогу уявити характер і напрямок пов’язаних з ними неотектонічних рухів і напружень. Викладене вище дає аргументовану, на наш погляд, підставу стверджувати подальший науково обґрунтований **розвиток методу геоіндикаційних досліджень**, а також запропонований нами **новий структурно-геодинамічний методологічний підхід до геологічного дешифрування даних ДЗЗ** і проблемно орієнтованої інтерпретації його результатів у комплексі з апріорними матеріалами геолого-геофізичних робіт [55]. Розвиток методу геоіндикаційних досліджень полягає у розробці теоретичних і технічних засобів пізнання, вивчення геологічних явищ і об’єктів (найперше розривних структур), які дають можливість отримувати нову про них інформацію.

Структурно-геодинамічний підхід до геологічного дешифрування МДЗ і проблемно орієнтованої інтерпретації його результатів задовільняє критеріям методологічного, оскільки дає змогу розв’язувати нову досить складну проблему і відповідні завдання стосовно морфокінематичної та геодинамічної специфіки диз’юнктивних деформацій земної кори, визначає новий метод їх вирішення у сукупності з традиційними методами і методичними способами. Сутність підходу полягає у виділенні та диференціації за морфокінематичними ознаками різноплангових розривних порушень, а також пов’язаних з ними сумірних полів тектонічних напружень (стиснення, розтягнення) на молодому і сучасному етапах розвитку земної кори за особливостями комплексу взаємодоповнюючих і синергетично підсилювальних один одного компонентів ланд-

шафту відповідного порядку (орогідрографія, поверхневі відклади та ступінь їхньої зволоженості, рослинність, ПТК загалом), які аналізують з використанням даних ДЗЗ [41–47, 49–53, 55, 57, 58 та ін.]. Вважаємо, що широке впровадження цього підходу в практику аерокосмогеологічних досліджень дасть можливість установити нові закономірності просторового розміщення родовищ різноманітних корисних копалин (передусім вуглеводнів) у полі неогеодинамічних напружень, прогнозувати нові нафтогазові поклади і рудовмісні тіла, адекватніше та ефективніше вирішувати інші завдання надрокористування і геоекології.

Зокрема, завдяки практичній апробації схематизованої методології нами отримані результати, які передані підприємству “Укргеофізика” й організаціям НАК “Нафтогаз України” і вже застосовані ними у процесі планування обсягів сейсморозвідувальних робіт та інтерпретації/переінтерпретації їх матеріалів, уточнення розломно-блокової будови й оцінки перспектив нафтогазоносності площ ДДЗ. У практику діяльності деяких підприємств МНС України та їх співвиконавців упроваджені розробки стосовно Чорнобильської зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, яка тектонічно належить до північного схилу УЩ. Ці розробки використовували для обґрунтування місць глибинної ізоляції радіоактивних відходів, оконтурювання небезпечних щодо токсичного забруднення зон підвищеної водопроникності поверхневих відкладів й інтенсивного живлення підземних вод, оптимізації мережі спостережного радіогідрогеоекологічного моніторингу тощо, що частково відображають матеріали зазначених публікацій.

У подальшому необхідно чітко розрізнати і класифікувати геоіндикатори кінематичних і геодинамічних характеристик диз’юнктивних об’єктів залежно від різних тектонічних утворень платформної частини території України (авлакоген, щит, схили щита тощо), а в межах останніх – залежно від головних ландшафтних зон (полісся, лісостеп, степ). Поряд з напруженнями розтягу, стиску і зсуву потрібно також розглянути поширені у природі типи деформацій згину і кручення. При цьому особливості прояву деформацій зсуву потребують детальнішого вивчення. Комплексне ретельне пізнання характеристик розломів і розривів (зокрема еталонних) слід проводити у межах завіркових полігонів.

Важливими також є встановлення і подальше детальне дослідження ландшафтних і дистанційних індикаторів розривних порушень різного порядку, приурочених до відмінних регіональних геотектонічних структур (давніх і молодих платформ, орогенів).

1. Азімов О.Т. Ландшафтні геоіндикатори характеристик розривних порушень як основа їх вивчення дистанційними методами. 1. Морфокінематичні ознаки диз'юнктивних структур // Геоінформатика. – 2009. – № 1. – С. 69–81.
2. Верховцев В.Г. Активные на новейшем этапе развития линейные геоструктуры Украины (результаты исследований масштабов 1 : 500 000 – 1 : 1 000 000) // Геол. журн. – 2004. – № 3. – С. 59–66.
3. Верховцев В.Г. Новітні платформні геоструктури України та динаміка їх розвитку: Автореф. дис. ... д-ра геол. наук: 04.00.01 “Загальна та регіональна геологія” / ІГН НАН України. – К., 2008. – 36 с.
4. Спіца Р.О. Структурно-геоморфологічні дослідження неотектонічно активних розломів платформних територій // Укр. геогр. журн. – 2008. – № 3. – С. 24–28.
5. Забродин В.Ю. Системный анализ дизъюнктивов. – М.: Наука, 1981. – 200 с.
6. Никонов А.А. Голоценовые и современные движения земной коры (Геолого-геоморфологические и сейсмотектонические вопросы). – М.: Наука, 1977. – 240 с.
7. Никонов А.А. Современные движения земной коры. – М.: Наука, 1979. – 184 с.
8. Хайн В.Е., Михайлов А.Е. Общая геотектоника. – М.: Недра, 1985. – 326 с.
9. Николаев Н.И. Новейшая тектоника и геодинамика литосферы. – М.: Недра, 1988. – 491 с.
10. Геодинамическая карта Украины. М 1 : 1 000 000. Объясн. записка / Гл. ред. Л.С. Галецкий. – Киев: Госкомгеология Украины, ГГП “Геопрогноз”, 1993. – 211 с.
11. Азімов О.Т. Методологія розрізнення диз'юнктивних дислокацій за матеріалами дистанційних зйомок. Ст. 3. Дані теоретичних розробок і експериментальних досліджень на моделях // Зб. наук. праць УкрДГРІ. – К., 2008. – № 4. – С. 137–159.
12. Белоусов В.В. Основные вопросы геотектоники. – М.: Госгеолтехиздат, 1954. – 606 с.
13. Павлинов В.Н. Глубинные сдвиги и парагенетически сопряженные с ними дизъюнктивные структуры (Ст. I) // Изв. вузов. Геология и разведка. – 1977. – № 8. – С. 3–14.
14. Шерман С.И. Сдвиги и трансформные разломы литосферы (тектонофизический анализ проблемы) // Проблемы разломной тектоники. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1981. – С. 5–26.
15. Высочанский И.В., Кром В.В., Чебаненко И.И. и др. Особенности тектоники Днепровско-Донецкого авлакогена (роль сдвигов в структурообразовании): Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 90–28. – Киев, 1990. – 42 с.
16. Чебаненко И.И., Вишняков И.Б., Власов Б.И. и др. Геотектоника Волыно-Подолии / Отв. ред. И.И. Чебаненко. – Киев: Наук. думка, 1990. – 244 с.
17. Высочанский И.В., Кром В.В., Зюзьевич Н.П. и др. Модели ловушек в породах кристаллического фундамента: Препр. (АН Украины. Ин-т геол. наук; 92–7). – Киев, 1992. – 53 с.
18. Верховцев В.Г., Знаменская Т.А., Чебаненко И.И. Системы разломов платформенной части территории Украины (Опыт тектонофизической интерпретации) // Геол. журн. – 1994. – № 4–6. – С. 115–122.
19. Пейве А.В. Горизонтальные движения земной коры и принцип унаследованности // Геотектоника. – 1965. – № 1. – С. 30–37.
20. Ажгирей Г.Д. Структурная геология. – [Изд. 2-е]. – М.: Изд-во МГУ, 1966. – 364 с.
21. Хайн В.Е. Общая геотектоника. – [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. – М.: Недра, 1973. – 512 с.
22. Гавриш В.К. Глубинные разломы, генетическое развитие и нефтегазоносность рифтогенов. – Киев: Наук. думка, 1974. – 160 с.
23. Чебаненко И.И. Теоретические аспекты тектонической делимости земной коры (на примере Украины). – Киев: Наук. думка, 1977. – 84 с.
24. Космическая информация в геологии / Отв. ред. В.Г. Трифонов и др. – М.: Наука, 1983. – 536 с.
25. Слензак О.И. Локальные структуры зон напряжений докембрия. – Киев: Наук. думка, 1984. – 104 с.
26. Гаврилов В.П. Общая и региональная геотектоника. – М.: Недра, 1986. – 184 с.
27. Паталаха Е.И. К проблеме листрических разломов // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1986. – № 11. – С. 113–120.
28. Тяпкин К.Ф. Изучение разломных и складчатых структур докембрия геолого-геофизическими методами. – Киев: Наук. думка, 1986. – 168 с.
29. Березкин В.М. Метод полного градиента при геофизической разведке. – М.: Недра, 1988. – 188 с.
30. Репин А.Г. О кайнозойской рифтовой системе на севере Западной Сибири // Сов. геология. – 1988. – № 12. – С. 68–75.
31. Высочанский И.В., Кром В.В., Чебаненко И.И., Ключко В.П. Тектонические нарушения и вопросы нефтегазоносности (особенности тектоники Днепровско-Донбасского авлакогена): Препр. (АН УССР. Ин-т геол. наук; 90–29). – Киев, 1990. – 38 с.
32. Знаменская Т.А., Верховцев В.Г. Системы разломов Северного борта Днепровско-Донецкой впадины // Геол. журн. – 1995. – № 2. – С. 89–94.
33. Євдощук М.І., Чебаненко І.І., Гавриш В.К. та ін. Теоретичні основи нетрадиційних геологічних методів пошуку вуглеводнів. – К.: НТП “Нафтогаз-прогноз”, 2001. – 288 с.
34. Николаенко Б.А. О дешифрировании структурных признаков горизонтальных движений в платформенной части Украины // Матеріали II Наук.-вироб. наради геологів-зйомщиків України “Актуальні питання вивчення та картування осадових комплексів складчастих областей та платформного чохла України. Картування прикордонних територій” (8–13 верес. 2003 р., м. Світлодарськ, Донецька обл.). – К.: УкрДГРІ, 2003. – С. 154–157.
35. Гинтов О.Б., Пашкевич И.К. Разломно-блоковая тектоника Волыно-Подолии. Кинематический анализ // Геофиз. журн. – 2004. – 26, № 1. – С. 56–70.
36. Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины. – Киев: Феникс, 2005. – 569 с.
37. Чебаненко И.И., Гожик П.Ф., Краюшкін В.О. та ін. Нафтогазоперспективні об'єкти України: Перспективи нафтогазоносності бортових зон западин України. – К.: Варта, 2006. – 264 с.
38. Lin S., Davis D.W., Rotenberg E. et al. Geological evolution of the northwestern Superior Province: Clues from geology, kinematics, and geochronology in the Gods Lake Narrows area, Oxford-Stull terrane, Manitoba // Canad. J. Earth Sci. – 2006. – 43, N 7. – P. 749–765.
39. Parmenter A.C., Lin S., Corkery M.T. Structural evolution of the Cross Lake greenstone belt in the northwestern Superior Province, Manitoba: implications for relationship between vertical and horizontal tectonism // Ibid. – P. 767–787.
40. Лебідь В.П. До проблеми нафтогазоносності виступів фундаменту Дніпровсько-Донецького розсуву // Мінерал. ресурси України. – 2007. – № 4. – С. 34–39.
41. Азімов О.Т. Геологічна інформативність дешифрування аеро- і космознімків у зв’язку з проблемою вибору

- площадок, придатних для депонування РАВ (на прикладі Вереснянської та Товстоліської ділянок) // Сучасні проблеми геологічної науки: Зб. наук. праць ІГН НАН України. – К., 2003. – С. 6–13.
42. Азімов О.Т. Вибір ділянок для захоронення радіоактивних відходів за результатами дешифрування матеріалів дистанційних зйомок // Геол. журн. – 2003. – № 4. – С. 59–64.
 43. Азімов О.Т. Розломно-блокова будова і сучасна геодинаміка Вереснянської ділянки (за результатами дешифрування матеріалів аерокосмічних зйомок) // Доп. НАН України. – 2004. – № 6. – С. 107–112.
 44. Азімов О.Т. Схема блокової структури Товстоліської ділянки (Коростенський pluton) з елементами сучасної геодинаміки за результатами дешифрування матеріалів дистанційного зондування Землі // Там само. – 2004. – № 10. – С. 114–119.
 45. Азімов О.Т. Теоретико-методичні аспекти використання дистанційних аерокосмічних методів при вивчені геодинамічних процесів // Вісн. Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Геологія. – 2004. – Вип. 29/30. – С. 88–93.
 46. Азімов О.Т. Оцінка сучасної геодинаміки території дистанційними методами в контексті вирішення проблем геологічної ізоляції небезпечних промислових відходів // Зб. наук. праць УкрДГРІ. – К., 2004. – № 2. – С. 141–152.
 47. Азімов О.Т. Методичні аспекти вивчення особливостей сучасної геодинаміки розломів платформної частини України (за матеріалами дистанційних зйомок) // Геологомінерал. вісн. Криворіз. техн. ун-ту. – 2005. – № 1. – С. 12–29.
 48. Шестопалов В.М., Руденко Ю.Ф., Соботович Э.В. и др. Изоляция радиоактивных отходов в недрах Украины (проблемы и возможные решения). – Киев: НИЦ РПИ НАН Украины, 2006. – 398 с.
 49. Azimov O.T. Using of geoinformatic technologies for geodynamic investigation in the aspect of local sites suitable for the radioactive waste deep isolation // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "ГІС-Форум 2006" (Київ, 17–19 трав. 2006 р.). – К.: КНУБА, 2006. – С. 145–149.
 50. Azimov O.T. Remote sensing data decoding results for the Tovstiy Lis site in the aspect of siting the grounds suitable for the radioactive waste deep isolation // Abstr. to the Int. Sci. Workshop "Radioecology of the Chernobyl Zone". Slavutych, 27–29 Sept., 2006. – Slavutych: Int. Radioecol. Lab., 2006. – Р. 97–98.
 51. Azimov O.T. Results of the structural and geodynamic decoding of remote sensing data in connection with the problem of grounds most promising for the radioactive waste isolation // The Int. conf. "Twenty Years after Chernobyl Accident. Future Outlook", Kyiv, Ukraine, April 24–26, 2006: Cont. Pap. – Kyiv: Innovation Publ. Centre "HOLTEH", 2006. – Р. 221–225.
 52. Азімов О.Т. Проблеми геологічної ізоляції небезпечних відходів в Україні та методичні аспекти їх вирішення з використанням матеріалів аерокосмічних зйомок // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – № 2. – С. 66–74.
 53. Азімов О.Т. Результати структурного дешифрування даних аерокосмічних зйомок (проблема вибору ділянок, сприятливих для глибинної ізоляції небезпечних промислових відходів) // Геолог України. – 2007. – № 2. – С. 50–60.
 54. Азімов О.Т. Методологія розрізнення диз'юнктивних дислокацій за матеріалами дистанційних зйомок. Ст. 1. Списка характеристика розривних порушень // Зб. наук. праць УкрДГРІ. – К., 2007. – № 4. – С. 135–143.
 55. Азімов О.Т. Дослідження диз'юнктивних дислокацій земної кори аерокосмічними методами (на прикладі регіонів України): Дис. ... д-ра геол. наук: 04.00.01 "Загальна та регіональна геологія" / ІГН НАН України. – К., 2008. – 485 с.
 56. Розанов Л.Н. Геодинамический подход к дешифрированию космоснимков при решении задач нефтегазовой геологии // Геология нефти и газа. – 1982. – № 6. – С. 39–42.
 57. Азімов О.Т. Теоретико-методичні засади дослідження структури геологічно похованіх територій дистанційними методами // Тези доп. IV Міжнар. наук. конф. "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" (Київ, 9–11 жовт. 2003 р.). – К.: Обрій, 2003. – С. 88–90.
 58. Azimov O.T. Basic results of the thematic decoding of remote sensing data (the problem of siting most promising for the radioactive waste deep isolation) // Зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" (Рибаче, 3–7 верес. 2007 р.). – К.: АДЕФ-Україна, 2007. – С. 32–33.

Надійшла до редакції 12.02.2009 р.

O. T. Azimov

ЛАНДШАФТНІ ГЕОІНДИКАТОРИ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРЫВНИХ ПОРУШЕНЬ ЯК ОСНОВА ЇХ ВИВЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ 2. ГЕОДИНАМІЧНІ ОЗНАКИ ДИЗ'ЮНКТИВНИХ СТРУКТУР

У статті для умов платформних зон охарактеризовано основні ландшафтні ознаки відмінних за своєю дією полів геодинамічних напружень на молодому і сучасному етапах тектогенезу, що пов'язані зі структурами земної кори диз'юнктивного генезису, а також особливості їх відображення на матеріалах дистанційних зйомок.

A. T. Azimov

ЛАНДШАФТНЫЕ ГЕОИНДИКАТОРЫ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ КАК ОСНОВА ИХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ 2. ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДИЗЮНКТИВНЫХ СТРУКТУР

В статье для условий платформенных областей охарактеризованы основные ландшафтные признаки отличительных по своему действию полей геодинамических напряжений на молодом и современном этапах тектогенеза, которые связаны со структурами земной коры дизъюнктивного генезиса, а также особенности их отображения на материалах дистанционных съемок.