

Таким образом, лазерная терапия при широком внедрении в практику дерматологии будет способствовать улучшению биологических процессов в коже, сокращению сроков лечения и числа рецидивов, а следовательно, даст экономический эффект.

УДК 616.5:616-002.828:616.596:616-08-031.84

ПРОФИЛАКТИКА МИКОЗОВ СТОП

Кутасевич Я. Ф., Олейник И.А., Пятикоп И.А., Загорская А.А., Стулий О.Н.

ГУ «Институт дерматологии и венерологии АМН Украины»

Вопросы, касающиеся профилактики грибковых заболеваний, продолжают оставаться в центре внимания клинической дерматологии, что обусловлено, в первую очередь, их значительной распространенностью и участвующими часто рецидивирующими тяжелыми формами заболевания. В настоящее время микотическими инфекциями страдает около 20% населения мира. Поэтому проблема эффективной профилактики микозов стоп по-прежнему не теряет своей актуальности.

Препаратом выбора для лечения микозов стоп является тербинафин, как наиболее эффективное лекарственное средство по отношению к основным возбудителям микозов стоп – дерматомицетам. Механизм фунгистатической активности тербинафина реализуется за счет блокирования действия энзимов сквален-эпоксидазы и последующего ингибирования трансформации сквалена в эпоксид-сквален, что приводит к гибели грибковой клетки. Разработана новая наружная форма тербинафина - "Ламизил Уно", которая представлена раствором и содержит пленкообразующие агенты. Раствор обеспечивает более высокую концентрацию тербинафина в роговом слое кожи, функциональная активность которой сохраняется до 13 дней. Оказывать длительное воздействие помогает его уникальная форма. Испаряясь с поверхности кожи, препарат образует уникальную, неощутимую прозрачную пленку из полимерной смеси. Активное вещество (тербинафин) находится в высокодиспергированном состоянии и быстро поступает в роговой слой эпидермиса. Раствор обеспечивает развитие стойкого противогрибкового эффекта, преодолевающего инфекцию и защищающего стопы от повторного развития заболевания.

В качестве профилактического средства мы назначали «Ламизил Уно» пациентам, ранее лечившимся по поводу микозов стоп и относящимся к группе риска. Препарат наносили на кожу стоп 1 раз в 2 недели. В течение года наблюдения за этими больными рецидивы микоза стоп зарегистрированы у 2 % пациентов. Таким образом применение препарата «Ламизил Уно», в качестве противорецидивного средства, значительно сократило количество рецидивов и являлось удобным в использовании.

УДК 616.56:614,876]-036.2(477)

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ КОНТАКТНИМ ДЕРМАТИТОМ ТА ІНШИМИ ХВОРОБАМИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ ЗА ОСТАННІ РОКИ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

В.Ю.Мангушева