



## Арія

Стиглість: ранній  
Господарське призначення: столовий  
Урожайність: 22 т/га на 40-45-й день після сходів, 47 т/га в кінці вегетації.

Вміст крохмалю: 14,7-15,3%

Споживчі якості: 3,8-4,0 бала.

Стійкість проти хвороб: стійкий проти раку картоплі, відносно стійкий проти фітофторозу листків і альтернаріозу.

Морфологічні ознаки: бульби рожеві, округло-овальні, м'якуш кремовий, квітки червоно-фіолетові.

Особливості сорту:

- інтенсивність росту бадилля та ранне бульбоутворення;

- висока товарність врожаю;

- висока польова стійкість проти вірусних хвороб;

- бульби стійкі до потемніння м'якуша;

- придатність до посадки свіжозібраними бульбами.

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Лісостеп

*Створений в Інституті картоплярства НААН  
Знаходиться в державному сортівипробуванні*

## Случ

Стиглість: середньостиглий

Господарське призначення: столовий

Урожайність: 45,0-50,0 т/га в кінці вегетації.

Вміст крохмалю: 17,5 %

Споживчі якості: добрі.

Стійкість проти хвороб: стійкий проти фітофторозу, кільцевої і мокрої бактеріальної гнилей, сухої фузаріозної гнилі, іржавої плямистості, потемніння м'якуша.

Морфологічні ознаки: бульби жовті, видовжено-овальні, з неглибокими вічками, м'якуш — від кремового до світло-жовтого забарвлення. Кущ середньовисокий, прямостоячий, стебла середньої товщини. Листок і його частки за розміром середні, помірно зелені. Рясність квіток низька, віночок квітки червоно-фіолетовий, ягодоутворення слабе.

Особливості сорту:

- високоврожайний;

- багатобульбовий;

- висока товарність бульб;

- відзивається на підвищені дози мінеральних добрив;

- придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Степ

*Створений в Інституті картоплярства НААН  
Знаходиться в державному сортівипробуванні*

