

УДК 616.314-084

© Н. Б. Кузняк, Н. М. Навольський, А. І. Калинчук

Буковинський державний медичний університет

Профілактичний огляд – перша інстанція в попередженні виникнення дефектів зубних рядів

На основі проведеного обстеження ми встановили високий рівень дефектів зубних рядів у поєднанні з патологічними прикусами у дітей віком 12–16 р. м. Чернівці.

Розглядаючи етіологічні фактори дефектів зубів і зубних рядів, перше місце серед причин займає карієс та його ускладнення, з яких 57 % не піддаються консервативному лікуванню.

Проблема карієсу залишається однією із основних проблем в стоматології. Немає жодного захворювання, яке б мало таке поширення. Найчастіше карієсом руйнуються фронтальні зуби (53 %), які мають велике значення в звукоутворенні та естетиці обличчя. Менше руйнуються перші моляри (29 %), що призводить до зниження висоти прикусу і формування укороченої зубної дуги при їх ранній втраті.

В таких умовах виникає необхідність протезування зубів і зубних рядів у період тимчасового та раннього змінного прикусу, за допомогою конструкцій протезів, які не тільки

не затримують ріст кісток щелеп, але й позитивно впливають на нормальний розвиток всього організму та зубощелепної системи.

Важливим залишається проведення профілактичних обстежень дітей у школах для усунення шкідливих звичок та попередження виникнення карієсу, можливість вчасного відновлення цілості коронок зубів консервативними методами.

Однак основним є усвідомлення батьків, які повинні перш за все зрозуміти проблему своєчасного лікування дефектів зубних рядів у дитини, а також необхідність профілактики карієсу.