УДК 616.314.17-06:616.33/.342-002.44

©Н. В. Мацко

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»

Оцінка пародонтологічного статусу у хворих із гастродуоденальними виразками

За даними наукових спостережень та досліджень останніх років, розвиток захворювань тканин пародонта зумовлені несприятливим впливом та складністю перебігу хронічної загальносоматичної патології, зокрема виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Тривалий хронічний перебіг захворювань травного тракту призводить до виснаження імунного захисту організму в цілому і створює негативний вплив на пародонт, мікрофлору та в поєднанні з ендогенними патогенними факторами пригнічує основні елементи системи захисту слизової оболонки порожнини рота.

Метою дослідження було визначення пародонтологічного статусу у хворих на гастродуоденальні виразки. Проведено клінічне обстеження 54 пацієнтів із гастродуоденальними виразками віком від 18 до 68 років. Вивчення стану тканин пародонта здійснювалось за стандартними індексами: спрощеним індексом гігієни рота (Green-Vermillion, 1964), папілярно-маргінально-альвеолярним індексом РМА (Parma, 1960) та комплексним пародонтальним індексом КПІ (П. А. Леус, 1988). За результатами проведених досліджень, у 81,5 % хворих виявлена патологія тканин пародонта із гастродуоденальними виразками, що характеризувало погіршення показників гігієнічного стану порожнини рота. Серед захворювань переважала клінічна картина катарального гінгівіту в'ялого хронічного перебігу в 10 осіб із 54, що становило 18,5 % і генералізованого пародонтиту в 34 осіб із 54 (63 %). З урахуванням тяжкості патологічного процесу було виділено наступні групи перебігу пародонтиту: 14 (41,2 %) пацієнтів з початковим ступенем; 18 (52,9 %) пацієнтів із I—II ступенями і 2 (5,9 %) — із III. Лише у 18,5 % усіх обстежених у тканинах пародонта патології не встановлено.

Таким чином, виявлені зміни у пародонтологічному статусі вказують на значну поширеність захворювань пародонта при гастродуоденальних виразках, що вимагає подальшого вивчення та з'ясування механізмів розвитку поєднаної патології.