

¹Національний інститут раку, Київ²Всеукраїнський центр радіохірургії Клінічної лікарні «Феофанія», Київ³Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕТ-КТ ПРИ ПЕРВИННІЙ МЕДІАСТИНАЛЬНІЙ В-ВЕЛИКОКЛІТИННІЙ ЛІМФОМІ



52

І.А. Крячок¹, Я.А. Степанішина¹,
Я.В. Кметюк², В.Г. Гур'янов³

Адреса:
Степанішина Яна Анатоліївна
03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Національний інститут раку
E-mail: yankastep@gmail.com

В останні роки доведено клінічну цінність використання позитронно-емісійної томографії в поєднанні з комп’ютерною томографією в процесі лікування хворих з різними варіантами лімфопроліферативних захворювань. У цій роботі доведено прогностичне значення метаболічного об’єму пухлини та загального гліколізу пухлинної маси, визначених до початку лікування, у хворих на первинну медіастинальну В-великоклітинну лімфому.

ВСТУП

В останні роки досягнуто значного успіху в лікуванні пацієнтів з первинною медіастинальною В-великоклітинною лімфомою (ПМВКЛ), особливо з часу застосування комбінації антрациклін-вмісних режимів поліхімітерапії (ПХТ) та анти-CD20 моноклонального анти-тіла (ритуксимаб) [1, 2]. Однак у частини хворих пухлина все ж залишається рефрактерною до терапії першої лінії, а у разі розвитку рецидиву, що найчастіше трапляється в перші 12–24 міс після завершення лікування, захворювання характеризується надзвичайною агресивністю, і відповідь на лікування не перевищує 25% [3–5].

Специфічних факторів прогнозу при ПМВКЛ немає. Як прогностичну модель використовують стандартний міжнародний прогностичний індекс (international prognostic index — IPI), але його роль при цьому варіанті лімфоми обмежена. Вік-адаптований показник (aaIPI) при ПМВКЛ прогностичного значення також не має [6]. Існує декілька публікацій, які базуються на ретроспективному аналізі прогностичної ролі деяких клінічних характеристик (вік старше 40 років, великий об’єм пухлинної маси, пізні стадії, підвищений рівень лактатдегідрогенази) [7–9], але прогностичного значення жодного з перерахованих факторів у проспективних дослідженнях не підтверджено. Таким чином, на сьогодні інтерес вченых спрямований на пошук надійних чинників прогнозу, що дозволило б в майбутньому застосовувати ризик-адаптовану терапію хворих на ПМВКЛ.

Позитронно-емісійна томографія, інтегрована з комп’ютерною томографією (ПЕТ-КТ), — радіологічний метод, що поєднує в собі можливість розмежування анатомічних структур і метаболічної активності пухлинної та здорової тканин. Цей метод на сьогодні займає провідне місце в діагностиці та оцінці відповіді на терапію у пацієнтів з агресивними лімфомами.

У низці робіт уже доведено [10] та все ще вивчається прогностичне значення ПЕТ-КТ у хворих на лімфому Ходжкіна. Згідно з чинними настановами з лімфоми Ходжкіна тактика лікування базується на даних ініціальnoї ПЕТ-КТ, а ризик-адаптований підхід передбачає інтенсифікацію або дескалацію терапії, що проводиться на основі результатів проміжної ПЕТ-КТ. У публікаціях [11–13] досліджено прогностичне значення метаболічного об’єму пухлини (metabolic tumor volume — MTV), зокрема, підкреслено зв’язок з виживаністю без прогресування. Цим даним суперечать результати Adams та співавторів (2015), де доведено переваги в прогнозуванні перебігу дифузної В-великоклітинної лімфоми шляхом застосування IPI порівняно з даними ПЕТ-КТ. Згідно з інформацією [14] MTV не пов’язаний з прогнозом при ПМВКЛ, однак в публікації йдеється про проведення проміжної ПЕТ-КТ для раннього аналізу відповіді пухлини на терапію. Прогностичне значення MTV та загального гліколізу пухлини (total lesion glycolysis — TLG) висвітлено в роботі міжнародної групи з вивчення екстранодальних лімфом IELSG. Згідно з попередніми даними високий рівень MTV та TLG асоціюється

Ключові слова: первинна медіастинальна В-великоклітинна лімфома, ПЕТ-КТ, метаболічний об’єм пухлини, загальний гліколіз пухлини.

з нижчим показником виживаності цієї категорії хворих.

ОБ'ЄКТИ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження полягала у визначенні прогностичної цінності кількісних параметрів ПЕТ-КТ, проведений перед початком лікування у пацієнтів з ПМВКЛ. Проаналізовано дані 34 хворих, яким вперше було встановлено діагноз ПМВКЛ, що отримували лікування в Національному інституті раку з 2010 по 2014 р. Усі пацієнти отримували ПХТ за схемою R-CHOP (ритуксимаб в комбінації з циклофосфамідом, доксорубіцином, вінкристином, преднізолоном) або R-da-EPOCH (ритуксимаб в поєднанні з циклофосфамідом, безперервно інфузією доксорубіцину, етопозиду, вінкристину, а також преднізолоном з ескалацією доз відповідних препаратів). Консолідауюча променева терапія із сумарною вогнищовою дозою 30–36 Гр була проведена у більшості пацієнтів.

Протокол проведення ПЕТ-КТ та оцінювання параметрів

Усі дослідження були виконані з використанням сканера Siemens Biograph PET/CT. Пацієнтам заборонялося їсти і пити солодкі напої мінімум 6 год до обстеження. Безпосередньо перед введенням радіофармпрепарату (РФП) вимірювали рівень глюкози в крові, щоб упевнитися, що він менше ніж 200 мг/дл. Сканування проводили приблизно через 60 хв після введення РФП. Введена активність розраховувалася відповідно до рекомендацій Європейської Асоціації ядерних медиків (FDG PET/CT EANM procedure guidelines for tumor imaging: version 2.0) і становила 555–925 MBq залежно від індексу маси тіла пацієнта. Сканування за протоколом «усе тіло» включало об'єм від основи черепа до верхньої третини стегон (6–7 «позицій лежачі» залежно від індексу маси тіла). Параметри сканування КТ для корекції атенуації: 120-keV, 11–100-mAs (залежно від індексу маси тіла), колімація по 5 мм, pitch – 0,75. Реконструйованіображення переглядалися незалежно двома радіологами на робочій станції Siemens Multimodality Workplace в спеціалізованому програмному пакеті (Syngo TrueD; Siemens Medical Solutions) в аксіальний, сагіттальні та коронарні площини. Кількісні параметри ПЕТ визначали в кожного пацієнта на етапі ініціального дослідження. При всіх дослідженнях розглядали такі характеристики, як: стандартизована величина накопичення РФП – SUV_{max} , її середнє значення – SUV_{mean} та MTV. MTV вираховували на основі порогового значення SUV_{max} – 20%. TLG розраховували як суму добутку SUV_{mean} і MTV всіх виявлених вогнищ у пацієнта:

$$TLG = \sum [SUV_{mean} \cdot MTV].$$

Аналіз результатів дослідження проводили в пакеті статистичного аналізу

MedCalc v. 17.2 (MedCalc Software Inc, Broekstraat, Belgium, 2017 р.). Для отримання кількісних показників розраховували середнє значення (M) та стандартне відхилення показника ($\pm SD$), для якісних – частоту показника (%). При порівнянні значень показників використано непараметричний критерій W-Вілкоксона, при зіставленні трьох груп використовували непараметричний критерій Крускала – Волліса і критерій Данна для множинних порівнянь. Критичний рівень значимості у всіх випадках прийнято за 0,05.

Для аналізу факторів, пов'язаних із ризиком несприятливого перебігу захворювання, використано метод побудови та аналізу логістичних моделей регресії, відбір значущих факторів ризику проводили методом покрокового включення/вилючення факторних ознак (Stepwise method). Для оцінки якості моделей використано метод побудови та аналізу кривих операційних характеристик (receiver operating characteristic curve – ROC-кривих). Оцінку якості прогнозування проводили за показниками площин під ROC-кривою (area under curve – AUC), чутливості, специфічності, прогностичної позитивного (positive predictive value – PPV) і негативного результатів тесту (negative predictive value – NPV) та відповідні 95% довірчі інтервали (95% ДІ).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У досліджуваній групі хворих переважали пацієнти жіночої статі (67,6%). Вік хворих становив 19–48 років (середнє значення 31,5 року). Близько 3/4 пацієнтів на момент встановлення діагнозу мали ранню I-II стадію патологічного процесу, однак при цьому у половини хворих поперечний розмір пухлини середостіння перевищував 10 см. Усі пацієнти отримували антрациклінмісні режими ПХТ в комбінації з анти-CD20 моноклональним антитілом (ритуксимабом). Характеристики хворих представлено в табл. 1.

Таблиця 1. Клінічна характеристика хворих

Характеристика хворих (n=37)	n (%)
Середній вік, M \pm SD, років	31,0 \pm 7,4
Молодше 60 років	37 (100)
Жінки	25 (67,6)
ECOG 0–1	28 (76,7)
ECOG >2	9 (24,3)
В-симптоми	14 (37,8)
Велика пухлина маса	
Максимальний поперечний розмір >10 см	19 (51,4)
Екстранодальні ураження >1	8 (21,6)
Ураження кісткового мозку	0 (0)
Стадія Ann Arbor I-II	26 (70,3)
Стадія Ann Arbor III-IV	11 (29,7)
Підвищений рівень лактатдегідрогенази	20 (54,1)
IPI низький/проміжний ризик	26 (70,3)
IPI проміжний/високий	11 (29,7)
Схема ПХТ R-CHOP	12 (32,5)
Схема ПХТ R-daEPOCH	25 (67,5)
Променева терапія на зону середостіння	31 (83,8)

По завершенню 6 курсів ПХТ 32 хворим було проведено ПЕТ-КТ, решті пацієнтів – КТ. У 20 (54,1%) хворих досягнуто повної відповіді (ПВ), підтвердженої ПЕТ-КТ, тобто редукція пухлинної маси за критеріями Cheson 2007 становила >75%, та у 15 з них метаболічна активність резидуальної пухлини не перевищувала 1–3 бали за критеріями Deauville (тобто накопичення РФП не вище, ніж в печінці). У 13 (35,1%) пацієнтів зафіксовано часткову відповідь (ЧВ) на терапію, у 5 з них залишкове накопичення РФП вище печінкового пулу (4 бали за Deauville). У 4 розвинулося прогресування під час проведення терапії, та у 3 з них, що мали ЧВ після 3-го курсу ПХТ, виник ранній рецидив. Таким чином, у 7 пацієнтів із досліджуваної групи простежувався несприятливий прогноз. 5 (13%) хворих померли в термін від 6 до 14 міс з дати закінчення лікування (3 – внаслідок рецидиву в центральній нервовій системі та 2 – від прогресування пухлини в середостінні, печінці).

Проведено аналіз вихідних параметрів ПЕТ-КТ у хворих, які досягли ПВ, ЧВ, та у тих, що не відповіли на терапію.

При проведенні аналізу статистично значущої відмінності показника SUV_{max} для пацієнтів із різною відповіддю на лікування не виявлено (табл. 2).

Виявлено збільшення ($p<0,001$) показника MTV у пацієнтів, які не відповіли на проведену терапію, порівняно з тими хворими, у яких на фоні лікування було досягнуто ПВ та ЧВ. При проведенні аналізу встановлено, що найбільше середнє значення показника наявне у пацієнтів з ПЗ (відмінність від груп ПВ та ЧВ статистично значуча; $p<0,05$), найнижче значення MTV – у пацієнтів із ПВ на терапію (відмінність від груп ЧВ та ПЗ статистично значуча; $p<0,05$).

Також виявлено збільшення ($p<0,001$) показника TLG у хворих із незадовільною відповіддю на лікування за даними контрольних ПЕТ-КТ та КТ. Встановлено, що найнижче середнє значення показника досягнуто у пацієнтів із ПВ (відмінність від груп ЧВ та ПЗ статистично значуча; $p<0,05$), однак статистично значущої різниці між групами ЧВ та ПЗ не виявлено.

У 30 із досліджуваних пацієнтів досягнуто ремісії захворювання, що триває від 32 до 59 міс протягом спостереження. Проведено порівняння функціональних параметрів ПЕТ-КТ при ініціальному дослідженні для хворих, які досягли стійкої ремісії, з групою ПЗ (табл. 3).

При проведенні аналізу не виявлено відмінності середнього значення показника SUV_{max} в групах пацієнтів із стійкою ремісією та ПЗ ($p=0,48$). Встановлено, що в групах хворих із несприятливим перебігом захворювання середнє значення показників MTV і TLG вище, ніж в групі пацієнтів, які досягли стійкої ремісії ($p<0,001$ та $p=0,003$ відповідно).

Таблиця 2. Аналіз параметрів ПЕТ-КТ при різних варіантах відповіді пухлини на ПХТ

Показник	M±SD			Рівень значущості відмінності між групами, р
	ПВ (n=20)	ЧВ (n=10)	ПЗ (n=7)	
SUV _{max} , од.	22,3±8,3	19,4±4,2	18,4±3,6	0,63
MTV, мл	429±265*	1100±538*	1838±577*	<0,001
TLG, мл	4390±3970*	10 260±4370*	13 210±2380*	<0,001

Для порівняння використано критерій Крускала – Волліса, апостеріорне порівняння проводили за критерієм Данна. Тут і далі: ПЗ – прогресування під час терапії або ранній рецидив.

*Відмінність від групи ПВ статистично значуча ($p<0,05$).

*Відмінність від групи ЧВ статистично значуча ($p<0,05$).

*Відмінність від групи ПЗ статистично значуча ($p<0,05$).

Таблиця 3. Аналіз зв'язку показників з несприятливим прогнозом перебігу ПМВКЛ

Показник	M±SD		Рівень значущості відмінності між групами, р
	Стійка ремісія (n=30)	ПЗ (n=7)	
SUV _{max} , од.	21,3±7,2	18,4±3,6	0,48
MTV, мл	653±490*	1838±577*	<0,001
TLG, мл	6410±4940*	13 210±2380*	0,003

Для порівняння використано критерій W-Вілкоксона.

*Відмінність від групи стійкої ремісії статистично значуча ($p<0,05$).

*Відмінність від групи ПЗ статистично значуча ($p<0,05$).

У табл. 4 наведено результати порівняння параметрів ПЕТ-КТ хворих, які живі понад 32 міс з дати встановлення діагнозу та померли внаслідок прогресування ПМВКЛ при терміні спостереження до 14 міс.

За параметром SUV_{max} групи хворих, що живі та померли внаслідок прогресування захворювання, не відрізнялися ($p=0,18$). Інші показники (MTV, TLG) були статистично значуще ($p<0,05$) вищими у пацієнтів, що загинули від прогресування лімфоми.

Таким чином, проведений аналіз свідчить про можливість використання показників MTV і TLG для прогнозування ризиків прогресування та смерті.

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ПРОГРЕСУВАННЯ

Для прогнозування ризиків було використано метод побудови та аналізу логістичних моделей регресії.

Для прогнозування ризику прогресування як фактори аналізували показники: MTV, TLG, вік старше 40 років, два і більше екстранодальних ураження, пізня стадія, чоловіча стать та ECOG >2.

Для відбору чинників, пов'язаних із ризиком прогресування, у багатофакторній логістичній моделі регресії було використано метод покрокового включення/виключення факторних ознак (поріг включення $p<0,1$ та виключення $p>0,3$). Після відбору ознак залишився лише один фактор ризику — показник MTV. Модель, побудована на цій факторній означені, адекватна: $\chi^2=16,9$ при DF=1;

$p<0,001$. Виявлено, що при зростанні показника MTV ризик прогресування підвищується ($p=0,005$; відношення шансів (ВШ) 1,4; 95% ДІ 1,1–1,7) на кожні 100 мл зростання MTV.

На рис. 1 наведено криву операційних характеристик цього тесту.




Рис. 1. Крива операційних характеристик тесту прогнозування ризику прогресування за показником MTV. Указано оптимальний поріг тесту, відповідну чутливість та специфічність

AUC становить 0,95 (95% ДІ 0,83–1,00), що свідчить про високі прогностичні характеристики тесту.

Вибір оптимального порогу для тесту проводився за Youden Index, критичний поріг MTV_{crit}=1156 мл. У випадку, якщо MTV >1156 мл, прогнозується високий ризик прогресування захворювання. Для вибраного порогу чутливість тесту

становить 100% (95% ДІ 59–100), специфічність — 90% (95% ДІ 73,5–97,9), PPV=70% (95% ДІ 44,4–87,2) і NPV=100%.

У 27 пацієнтів вихідний показник MTV коливався в межах від 119 до 1155 мл, усі вони по завершенню терапії досягли ПВ або ЧВ. Найдовший термін спостереження в цій групі становить 59 міс, найкоротший — 32 міс. При медіані спостереження 33,2 міс ознак захворювання в цій групі не відмічено. 10 пацієнтів досліджуваної групи на момент встановлення діагнозу ПМВКЛ мали показник MTV >1156 мл, у 7 (70%) з них було зафіксовано ПЗ, що свідчить на користь наведеної прогностичної моделі.

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ЛЕТАЛЬНОГО ВИПАДКУ

Для прогнозування ризику летального випадку як фактори аналізували ті самі показники, що й при аналізі ризику прогресування: MTV, TLG, вік >40, два і більше екстранодальних ураження, пізня стадія, чоловіча стать та ECOG >2.

Після відбору ознак (Stepwise method) при порозі включення $p<0,1$ та виключення $p>0,3$) залишився лише один фактор ризику — показник MTV. Модель, побудована на цій факторній означені, адекватна: $\chi^2=15,5$ при DF=1; $p<0,001$. Виявлено, що при зростанні показника MTV ризик смерті від захворювання підвищується ($p=0,009$; ВШ=1,4; 95% ДІ 1,1–1,8) на кожні 100 мл зростання MTV.

На рис. 2 наведено криву операційних характеристик цього тесту.

AUC становить 0,96 (95% ДІ 0,84–1,00), що свідчить про високі прогностичні характеристики тесту.

Оптимальний поріг тесту MTV_{crit} становив 1563 мл. У випадку, якщо MTV >1563 мл, прогнозується високий ризик смерті хворого. Для вибраного порогу чутливість сягала 80% (95% ДІ 28,9–99,5), специфічність — 96,9% (95% ДІ 83,8–99,9), PPV=80%




Рис. 2. Крива операційних характеристик тесту прогнозування ризику смерті від захворювання за показником MTV. Вказано оптимальний поріг тесту, відповідну чутливість та специфічність

Таблиця 4. Порівняльний аналіз значень параметрів ПЕТ-КТ у хворих, що живі та померли внаслідок прогресування захворювання

Показник	M±SD		Рівень значущості відмінності між групами, р
	Живі (n=32)	Померли (n=5)	
SUV _{max}	21,3±6,9	17,2±3,6	0,18
MTV мл	698±506*	2027±584*	0,001
TLG мл	6770±4970*	13 680±2690*	0,008

Для порівняння використано критерій W-Вілкоксона.

*Відмінність від групи живих статистично значуча ($p<0,05$).

*Відмінність від групи померлих статистично значуча ($p<0,05$).

(95% ДІ 35,6–96,7) і NPV=96,9% (95% ДІ 84,3–99,4).

Із 6 хворих, у яких при ініціальній ПЕТ-КТ MTV сягав та перевищував 1562,7 мл, 4 померли від прогресування лімфоми. Усі летальні випадки сталися під час проведення терапії або через >12 міс після її завершення. У 3 із цих 4 пацієнтів зареєстровано прогресування пухлинного процесу в центральній нервовій системі.

Неподавно опубліковано результати дослідження міжнародної групи з вивчення екстранодальних лімфом IELSG 26 [9], в якому також оцінювали прогностичну цінність параметрів ПЕТ-КТ. У роботі [6] як прогностично значущі виділено параметри MTV та TLG при оцінці кожного окремо, що підтверджується результатами нашого дослідження. Однак при багатофакторному аналізі, що проводився в описаному дослідженні, статистично значуще гірше показники виживаності мали пацієнти з високим рівнем TLG. У нашій роботі основну прогностичну цінність доведено стосовно MTV. Слід зауважити, що ці два показники певною мірою взаємозалежні. Важливо підкреслити також і те, що в роботі IELSG 26 проводили оцінку даних більшої кількості хворих (103 пацієнти). SUV_{max} , як згідно з нашими результатами, так і відповідно до даних IELSG 26, з прогнозом перебігу ПМВКЛ не пов'язаний.

ВИСНОВКИ

На основі отриманих нами даних є підстави стверджувати, що стандартизована величина накопичення РФП (SUV_{max}) не має прогностичної цінності, та її значення у хворих із різним перебігом ПМВКЛ не відрізняється. При моноваріантному аналізі встановлено зв'язок показників MTV та TLG з прогнозом перебігу захворювання. Однак при мультифакторному аналізі (при врахуванні також стандартних клінічних факторів ризику) прогностично значущим виявився лише MTV до початку лікування. Згідно з проведеним нами аналізом прогностично сприятливим є показник MTV <1156 мл, значення MTV вище вказаного рівня асоціюється з частим розвитком рефрактерності та прогресування захворювання попри проведення ритуксимабмісної терапії; чутливість тесту становила 100% (95% ДІ 59–100), специфічність — 90% (95% ДІ 73,5–97,9).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Rosenwald A., Wright G., Leroy K. et al. (2003) Molecular diagnosis of primary mediastinal B cell lymphoma identifies a clinically favorable subgroup of diffuse large B cell lymphoma related to Hodgkin lymphoma. *J. Exp. Med.*, 198(6): 851–862.
- Kuruvilla J., Pintilie M., Tsang R. (2008) Salvage chemotherapy and autologous stem cell transplantation are inferior for relapsed or refractory primary mediastinal large B-cell lymphoma compared with diffuse large B-cell lymphoma. *Leuk. Lymphoma*, 49(7): 1329–1336.
- Cerlani L., Martelli M., Zinzani P.L. et al. (2015) Utility of baseline 18FDG-PET/CT functional parameters in defining prognosis of primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma. *Blood*, 126(8): 950–956.
- Aoki T., Izutsu K., Suzuki R. (2013) Novel prognostic model of primary mediastinal large B-cell lymphoma (PMBL): a multicenter cooperative retrospective study in Japan. *ASH Ann. Meet. Abstr.*, 122(21): 638.
- Zinzani P.L., Martelli M., Bertini M. (2002) Induction chemotherapy strategies for primary mediastinal large B-cell lymphoma with sclerosis: a retrospective multinational study on 426 previously untreated patients. *Haematologica*, 87(12): 1258–1264.
- Savage K.J., Monti S., Kutok J.L. (2003) The molecular signature of mediastinal large B-cell lymphoma differs from that of other diffuse large B-cell lymphomas and shares features with classical Hodgkin lymphoma. *Blood*, 102(12): 3871–3879.
- Andrew M., Kosakoglu L. (2015) The role of FDG-PET in defining prognosis of Hodgkin lymphoma for early-stage disease. *Blood*, 124(1): 3356–3364.
- Sasanelli M., Meignan M., Haioun C. et al. (2016) Pretherapy metabolic tumour volume is an independent predictor of outcome in patients with diffuse large B-cell lymphoma. *Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging*, 57(5): 728–734.
- Mikhael N.G., Smith D., Dunn J.T. et al. (2016) Combination of baseline metabolic tumour volume and early response on PET/CT improves progression-free survival prediction in DLBCL. *Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging*, 43: 1209–1219.
- Cottetereau A.S., Lanic H., Mareschal S. et al. (2016) Molecular Profile and FDG-PET/CT Total Metabolic Tumor Volume Improve Risk Classification at Diagnosis for Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma. *Clin. Cancer Res.*, 22: 3801–3809.
- Schöder H., Zelenetz A.D., Hamlin P. et al. (2016) Prospective study of 3'-deoxy-3'-18F-fluorothymidine PET for early interim response assessment in advanced-stage B-cell lymphoma. *J. Nucl. Med.*, 57(5): 728–734.

Прогностическое значение параметров ПЭТ-КТ при первичной медиастинальной В-крупноклеточной лимфоме

І.А. Крячок¹, Я.А. Степанишина¹, Я.В. Кметюк², В.Г. Гурьянов³

¹Національний інститут рака, Київ

²Всесукаїнський центр радіохірургії Клінічної больниці «Феофанія», Київ

³Національний медичинський університет імені А.А. Богомольця, Київ

Резюме. В последние годы доказана клиническая ценность использования позитронно-эмиссионной томографии в сочетании с компьютерной томографией в процессе лечения больных с различными вариантами лимфопролиферативных заболеваний. В данной работе доказано прогностическое значение метаболического объема опухоли и общего гликолиза опухолевой массы, определенных до начала лечения, у больных первичной медиастинальной В-крупноклеточной лимфомой.

Ключевые слова: первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома, ПЭТ-КТ, метаболический объем опухоли, общий гликолиз опухоли.

The prognostic value of functional parameters of PET-CT in the primary mediastinal large B-cell lymphoma

I.A. Kriachok¹, I.A. Stepanishyna¹, Y.V. Kmetiuk², V.G. Gurianov³

¹National Cancer Institute, Kyiv

²Ukrainian Center of Radiation Surgery of Clinical Hospital «Theophania», Kyiv

³National Medical University named after O.O. Bogomolets, Kyiv

Summary. Recently has been proven the clinical value of application of positron emission tomography in combination with computed tomography in the treatment process of patients with various types of lymphoproliferative diseases. In this work was proved the prognostic value of the metabolic tumor volume and total lesion glycolysis determined before treatment in patients with primary mediastinal large B-cell lymphoma.

Key words: primary mediastinal large B-cell lymphoma, PET-CT, metabolic tumor volume, total lesion glycolysis.