

Проект «Післядипломне навчання на сторінках журналу «Ліки України»

Випуск 5/2011

Фах: гастроентерологія

Модератор: кафедра гастроентерології ХМАПО

Термін відправлення відповідей: протягом одного місяця з дати отримання журналу

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Анкета учасника проекту «Післядипломне навчання на сторінках журналу «Ліки України»

1. ПІБ _____
Прізвище, ім'я, по батькові

2. Лікарська атестаційна категорія (на даний момент) _____

3. Професійні дані
Спеціальність _____ Звання _____ Посада _____
Останнє удосконалення (вид) _____ Останнє удосконалення (років) _____

4. Місце роботи
Повна назва закладу _____
Повна адреса закладу _____
Відомча належність (підкреслити): МОЗ, МШС, МО, СБУ, МВС, АМН, ЛОО або ін. _____

5. Домашня адреса
Індекс _____ Область _____ Район _____ Місто _____
Вулиця _____ Будинок _____ Корпус _____ Квартира _____

6. Контактні телефони
Домашній _____ Робочий _____ Мобільний _____

7. E-mail _____

Особистий підпис _____

Я, _____ (П.І.Б.), надаю свій дозвіл на обробку моїх, вказаних вище, персональних даних відповідно до сформульованої в анкеті (учасника проекту) мети _____ Ваш підпис

Надсилати лише оригінали тестів

Правила відповідей на тести:

Позначайте правильну відповідь на запитання.

Ви можете вказати один або декілька правильних варіантів відповідей.

Журнал «Ліки України» Ви і Ваші колеги можуть придбати:

1. Шляхом передплати через Укрпошту (передплатний індекс 40543).
2. На медичних заходах, де представлено журнал «Ліки України».
3. За сприяння представників фармацевтичних компаній, з якими Ви співпрацюєте.

Тестовые вопросы для самоконтроля

- Эрадикационная терапия предполагает обязательный контроль ее эффективности через:**
 - 2–3 недели;
 - 4–6 недель;
 - 1 месяц;
 - 1 год.
- Факторы, определяющие частое рецидивирующее течение эрозий желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК):**
 - наличие инфекции *Helicobacter pylori* (*Hp*);
 - прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);
 - низкий комплаенс, т.е. отсутствие готовности больного к сотрудничеству с врачом, проявляющееся в отказе прекратить курение и употребление алкоголя, нерегулярном приеме лекарственных препаратов;
 - все перечисленное верно.
- Этиологические факторы развития эрозий гастродуоденальной области:**
 - снижение активности защитных факторов слизистой оболочки желудка;
 - активация факторов агрессии;
 - повышение проницаемости слизистой оболочки желудка и ДПК;
 - нарушение продукции слизи и замедление процессов регенерации желудочного эпителия;
 - все перечисленное верно.
- Острые эрозии чаще локализуются:**
 - фундальный отдел;
 - тело желудка;
 - ДПК.
- Хронические эрозии чаще локализуются:**
 - кардиальный отдел;
 - антральный отдел;
 - ДПК.
- Поражения, связанные с действием НПВП, обусловлены:**
 - увеличением образования фактора некроза опухоли-альфа;
 - усилением хемотаксиса нейтрофилов в слизистой оболочке желудка;
 - блокированием синтеза простагландинов;
 - все перечисленное верно.
- К селективным прокинетикам не относятся:**
 - домперидон;
 - праймер;
 - трибудат;
 - мосид;
 - фрактал.
- К комбинированным прокинетикам не относятся:**
 - домперидон;
 - метаклопрамид;
 - итоприд;
 - лимзер.
- Основной подтверждающий диагностический метод хронической эрозии желудка:**
 - фракционное зондовое исследование желудочного сока;
 - рентгеноскопия желудка;
 - выявление *Hp*;
 - фагогастродуоденоскопия (ФГДС) с биопсией.
- Осложнения эрозий желудка и ДПК:**
 - острое гастродуоденальное кровотечение;
 - хроническое гастродуоденальное кровотечение;
 - трансформация эрозии в гиперпластический полип;
 - все перечисленное верно.
- Ко многокомпонентным препаратам (антацидам 2-го поколения) не относятся:**
 - маалокс;
 - альмагель;
 - фосфалюгель;
 - сукральфат.