

## Тестові запитання для самоконтролю

- 1. Група інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ), до якої належить раміприл:**
  - а) несольфгідрильний, водорозчинний;
  - б) сольфгідрильний, водорозчинний;
  - в) несольфгідрильний, ліпофільний;
  - г) сольфгідрильний, ліпофільний.
- 2. Середня терапевтична доза раміприлу для лікування артеріальної гіпертензії:**
  - а) 2,5–10 мг;
  - б) 20–40 мг;
  - в) 2,5–5 мг;
  - г) 5–15 мг.
- 3. Найбільше дослідження з вивчення високого і дуже високого серцево-судинного ризику з використанням раміприлу:**
  - а) SAVE;
  - б) HOPE;
  - в) SOLVD;
  - г) ADAPT.
- 4. Дози раміприлу, що мають здатність викликати зворотний розвиток гіпертрофії міокарда лівого шлуночка:**
  - а) низькі дози;
  - б) середні дози;
  - в) високі дози;
  - г) будь-які дози.
- 5. Відсоток зниження серцево-судинної смертності у дослідженні HOPE в гілці раміприлу:**
  - а) 32%;
  - б) 20%;
  - в) 26%;
  - г) 35%.
- 6. Кінцевий період напіввиведення для раміприлу:**
  - а) 2 години;
  - б) 5–10 годин;
  - в) 13–17 годин;
  - г) >24 годин.
- 7. При підборі дози раміприлу у пацієнтів потрібно враховувати:**
  - а) супутні захворювання не мають значення;
  - б) функцію нирок;
  - в) вік.