

Содержание

ГИНЕКОЛОГИЯ

- Неспецифичні запальні захворювання зовнішніх статевих органів у дітей та підлітків**
І.Б. Вовк, В.Ф. Петербурзька, В.К. Кондратюк 5
- Эндометриоз: взгляд практического врача на патогенез**
П.Н. Веропотвелян, А.А. Бондаренко, Н.П. Веропотвелян 23
- Сучасні підходи до лікування альгодисменореї**
А.П. Григоренко, Н.С. Шатковська, О.Х. Герич, О.Г. Горбатюк, В.Ю. Онишко, А.М. Більковська 38
- Комплексна терапія захворювань шийки матки з використанням препаратів Депабол і Лавомакс 44**
- Тержинан глазами фармаколога: инновационный подход к терапии вагинитов различного генеза**
В.И. Мамчур, С.Н. Дронов 50
- Профилактика спайкообразования при гинекологических операциях на органах малого таза**
П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, Н.П. Веропотвелян, С.А. Журавлева 63

АКУШЕРСТВО

- Применение ЭМА в качестве эндоваскулярного способа отделения части приращенной плаценты в послеродовом периоде (клинический случай)**
В.В. Трегуб, В.И. Тарасюк, Е.К. Тарасюк, В.А. Кондратюк, И.В. Альтман 13
- Синдром втрати плода: сучасні підходи до лікування**
Л.М. Маланчук, З.М. Кучма, С.Л. Маланчук 19
- Прогнозирование преэклампсии: современные возможности лабораторной диагностики**
О.В. Рыкова 75

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Применение комбинированных препаратов повышает эффективность лечения инфекционно-воспалительных процессов . . 33**
- Инновационные подходы в акушерстве, гинекологии и репродуктологии**
Обзор научно-практической конференции
А.Г. Резников, С.Р. Галич 58

УРОЛОГИЯ

- Уринарная микробиота, или является ли моча стерильной?**
С.П. Пасечников 29

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

- К юбилею Зинаиды Михайловны Дубоссарской 36**
- Дайджесты 12, 32, 74**
- Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2015 71**



ПОЛІЖИНАКС
ПОЛІЖИНАКС ВІРГО
НЕОМИЦИН + ПОЛІМІКСИН В + НІСТАТИН

БАЛАНС між
ЕФЕКТИВНІСТЮ
та ДБАЙЛИВИМ
СТАВЛЕННЯМ
до екосистеми
піхви



- надійно та дбайливо діє при бактеріальному вагініті та кандидозі
- діє на збудників найбільш поширених інфекцій
- виявляє протизапальну дію без гормонів
- для лікування та профілактики післяопераційних та післяпологових ускладнень

Представництво в Україні:
Київ 01001, вул. Мала Житомирська, 6
Тел.: (044) 278 06 38, innotech@innotech.com.ua

Склад: 1 капсула вагінальна містить неомицин сульфат 35 000 МО, поліміксин В сульфат 35 000 МО, ністатин 100 000 МО. Фармакотерапевтична група. Протимікробні та антисептичні засоби для застосування у гинекології. Антибіотики. Ністатин. Комбінації. Код АТХ G01A A51.

Показання: Лікування вагітні, спричиненої чутливими до препарату мікроорганізмами, у тому числі:
• бактеріальний вагініт, спричинений банальною пігментною мікрофлорою;
• рецидивуючий неспецифічний вагініт;
• вагініт, спричинений грибами роду Candida (Candida albicans і Candida non-albicans);
• вагініт, спричинений змішаною інфекцією.

З метою профілактики інфекційних ускладнень Поліжинакс рекомендується застосовувати перед початком будь-якого хірургічного втручання на статевих органах, перед аборт, встановленням внутрішньоматкового засобу, перед і після діатермокоагуляції шийки матки, перед проведенням внутрішньоматкових та внутрішньоуретральних обстежень, перед пологами.

Протипоказання: Підвищена чутливість до будь-якого компонента (комбінації компонентів) препарату. Через наявність сполі сової Поліжинакс протипоказаний пацієнтам з алергією до солі та арансу.

Застосування у період вагітності або годування груддю. У клінічних дослідженнях Поліжинаксу на даний час не було відзначено та не повідомлялося про випадки виникнення вад розвитку або фетотоксичності. Спостережень за вагітністю, що зазнала впливу цього лікарського засобу, недостатньо, щоб виключити будь-який ризик. Тому застосування препарату у період вагітності можливе лише за призначенням лікаря у тих випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Через відсутність даних щодо проникнення препарату у грудне молоко застосування цього препарату слід уникати у період годування груддю.

Спосіб застосування та дози. Дорослим застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування — 12 днів, профілактичний курс — 6 днів. Не слід переривати курс лікування під час менструації.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. Іннотера Швай, Франція/Innothera Clouzy, France.