

© Л.М. Якушин

д-р геол. наук

I.I. Іщенко

канд. геол. наук

ДП «Науканафтогаз»

L.M. Yakushyn

Dr. Geol. Science

I.I. Ishchenko

Cand. Geol. Science

SE «Naukanaftogaz»

Стратиграфічна схема крейдових відкладів українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів як основа подальших геологорозвідувальних робіт на нафту та газ

Stratigraphic scheme of the Cretaceous sediments of the Ukrainian part of the Black and Azov Seas as a basis for further exploration work for oil and gas

UDC 551.76.02(084.2)(262.5-16)+(262.54)

Запропоновано схему стратиграфії крейдових відкладів української частини акваторій Чорного й Азовського морів, створену на основі комплексного вивчення результатів буріння та аналізу всіх опублікованих матеріалів щодо цих відкладів.

Ключові слова: крейдові відклади, український сектор акваторій Чорного та Азовського морів, стратиграфічна схема.

Предлагается схема стратиграфии меловых отложений украинской части акваторий Черного и Азовского морей, созданная на основе комплексного изучения результатов бурения и анализа всех опубликованных материалов по этим отложениям.

Ключевые слова: меловые отложения, украинский сектор акваторий Черного и Азовского морей, стратиграфическая схема.

It is carried out dismembering and correlation of the Cretaceous deposits of the Ukrainian part of the Black and Azov seas on the basis of a comprehensive studying, a thorough analysis of available published materials and by the results of drilling. It is worked out a regional stratigraphic scheme of the Cretaceous deposits of the investigated area.

Key words: Cretaceous sediments, waters Ukrainian sector of the Black and Azov Seas, stratigraphic scheme.

В українському секторі акваторій Чорного та Азовського морів на 22 площах буріння розкриті відклади крейдової системи – 18 площ (36 свердловин) на північно-західному шельфі Чорного моря та 4 площі (4 свердловини) в акваторії Азовського моря. У цих відкладах відкрито газове родовище Шмідта (пов'язане з утвореннями маастрихту) та виявлено численні нафтогазопрояви та непромислові припливи газу на Голіцинському та Одеському родовищах, а також під час буріння на Каркінітській, Фланговій та Штильовій площах. Це свідчить про певні перспективи крейдових відкладів на вуглеводні та про значний вуглеводневий потенціал зазначененої території. За даними ЛВ УкраїДГРІ (2008 р.), початкові сумарні ресурси крейдового комплексу українського сектора Чорного та Азовського морів становлять близько 657,6 (нижньокрейдового – 433,5, верхньокрейдового – 224,1) млн т у.п. Враховуючи те, що більша частина структур акваторій Чорного та Азовського морів вже розбурена по відкладах кайнозою і приблизно 70 % структур цієї території підготовлені для буріння по відбиваючих горизонтах крейди, основні перспективи нафтогазоносності пов'язані саме з цим породним комплексом. Тому для ефективного проведення подальших геологорозвідувальних робіт актуальним та необхідним на сьогодні є створення надійної стратиграфічної схеми цих відкладів.

Основи стратиграфії крейдових відкладів української частини акваторій Чорного та Азовського морів були закладені ще у 60–70 роках минулого століття, коли розпочалося активне розбурювання північно-

In the Ukrainian sector of the waters of Black and Azov Seas on 22 drilling areas the sediments of Cretaceous System were discovered – 18 areas (36 wells) on the northwestern shelf of the Black Sea and 4 areas (4 wells) in the Sea of Azov waters). A Schmidt gas field (associated with Maastricht formations) was discovered in these deposits and numerous oil and gas shows and non-industrial influxes of gas were found on Holitsynske and Odeske fields, as well as during drilling on Karkinitksa, Flanhova and Shtyliova areas. This indicates some promises of Cretaceous sediments for hydrocarbons and a significant hydrocarbon potential of the designated area. According LV UkrDGRI (2008) the initial total resources of the Cretaceous complex of the Ukrainian sector of the Black and Azov Seas are about 657.6 (Lower Cretaceous – 433.5, Upper Cretaceous – 224.1) million tons of standard fuel. Given that most of the structures of the Black and Azov Seas waters are already drilled to Cenozoic sediments and about 70% of the structures of this territory are prepared for drilling to Cretaceous horizons the major oil and gas prospects are associated with this rock complex. Therefore, for the effective conduct of further exploration work the relevant and necessary as of today is to create a reliable stratigraphic scheme of these deposits.

The basics of stratigraphy of Cretaceous sediments of the Ukrainian part of the Black and Azov Seas waters were established in the 60-70's of the last century, when active drilling of the Black Sea north-western shelf for oil and gas started. The first substantial generalized study of their

західного шельфу Чорного моря на нафту та газ. Першою грунтовною узагальнюючою роботою із досліджень їх стратиграфії стала колективна монографія «Геологія шельфа УССР. Стратиграфія (шельф и побережья Черного моря)» під редакцією С.Ф. Шнюкова [1]. Результати подальшого вивчення цих відкладів викладені у численних звітах, наукових статтях та монографіях [1–24].

Попри тривалий період вивчення та значні обсяги геолого-геофізичних робіт, на теперішній час геологічна будова відкладів крейди цієї території залишається ще недостатньо з'ясованою і має багато дискусійних питань.

Для уточнення стратиграфії крейдових відкладів української частини акваторій Чорного та Азовського морів та створення стратиграфічної схеми нами використано всі існуючі геолого-геофізичні матеріали буріння свердловин 1, 2, 3-Безіменної, 2-Гамбурцева, 1, 2, 4, 5-Голіцина, 1-Десантної, 2-Євпаторійської, 2-Іллічівської, 1, 2-Каркінітської, 2, 4, 5, 6, 20-Одеської, 1-Південно-Бортової, 3, 25-Південноголіцинської, 2-Прадніпровської, 40, 43-Сельського, 1-Федорівської, 2-Флангової, 1-Центральної, 5, 6, 9, 10, 11, 12-Шмідта, 2-Штильової, 2, 5-Штормової, 1-Електророзвідувальної, 1-Західно-Бірючої, 1-Матроської, 2-Морської, 1-Обручева та 20-Стрілкова та результати регіональних сеймічних досліджень.

Методи дослідження: геофізичний, сейсмостратиграфічний та літобіостратиграфічний.

Результати дослідження та їх аналіз

На території дослідження крейдові відклади значно поширені на акваторіях Чорного та Азовського морів у межах Східноєвропейської платформи (СЕП), Скіфської плити та Чорноморської западини.

На північно-західному шельфі Чорного моря більшість свердловин зупинено у відкладах верхньої крейди. Розкритий розріз у складі всіх ярусів – сеноман, турон, коньяк, сanton, кампан, маастрихт. Нижній віddіл представлений лише альбським ярусом. Верхня крейда представлена переважно вапняками, з підпорядкованим значенням мергелів та писальної крейди, рідше глинами, пісковиками і вулканогенними утвореннями. Товщина відкладів до 2400 м. Нижня крейда складена у більшості теригенними породами: аргілітами та пісковиками з підпорядкованим значенням карбонатних мергелів та вулканічних туфітів. Товщина відкладів до 1000 м.

На акваторії Азовського моря крейдові відклади поширені майже повсюдно, окрім Середньоазовського підняття, де вони зустрічаються тільки на території Морського блока. Розріз верхньої крейди представлений сеноманським, сantonським, кампанським та маастрихтським ярусами. Склад ярусів суттєво відрізняється за об'ємом, літологічним складом, товщиною і розповсюдженням порід. Відклади представлені карбонатними та теригенними породами. Серед карбонатних порід переважають вапняки, а серед теригенних – аргіліти та пісковики. Повна пройдена товщина відкладів верхньої крейди становить близько 950 м на Матроському піднятті. Нижньокрейдовий розріз представлений тільки відкладами альбу. Вони представлені теригенно-глинистими породами – аргілітами, алевролітами та пісковиками. Пройдена товщина відкладів нижньої крейди сягає близько 200 м на Західнобірючому піднятті.

За характерними рисами геологічної будови крейдових відкладів на північно-західному шельфі Чорного моря виділено шість структурно-фаціальних районів: Криловський, Губкінсько-Кілійсько-Зміїний, Південнокраїнської монокліналі, Каркінітський, Крайового уступу та Каламітський; у межах українського сектора Азовського моря три райони: Північноазовський, Середньоазовський та Індольський.

stratigraphy was a monograph «Shelf Geology of the USSR. Stratigraphy (shelf and coasts of the Black Sea)» edited by E.F. Shniukov [1]. The results of further study of these deposits are contained in numerous reports, scientific articles and monographs [1–24, etc.].

Despite a long period of study and significant amounts of geological and geophysical work now the geological structure of Cretaceous sediments of the area is still not clarified and has a lot of questions unanswered.

To clarify the stratigraphy of the Cretaceous sediments of the Ukrainian part of waters of the Black and Azov Seas and to create the stratigraphic scheme we used all available geological and geophysical data from drilling the following wells: Bezmenna-1, 2, 3, Hamburtseva-2, Holitsyna-1, 2, 4, 5, Desantna-1, Evpatoriiska-2, Illichivska-2, Karkinitksa-1, 2, Odeska-2, 4, 5, 6, 20, Pivdenno-Bortova-1, Pivdenoholitsynska-3, 25, Pradniprovska-2, Selskoho-40, 43, Fedorivska-1, Flanhova-2, Tsentralna-1, Schmidta-5, 6, 9, 10, 11, 12, Shtyliova-2, Shtormova-2, 5, Elektrorozviduvalna-1, Zakhidno-Biriucha-1, Matroska-1, Morska-2, Obrucheva-1 and Strilkova-20 and the results of regional seismic studies.

Research Methods: geophysical, seismo-stratigraphic and lithobiostratigraphic.

Research results and their analysis

In the area of research the Cretaceous sediments are distributed in the waters of Black and Azov Seas within the East European Platform (EEP), Scythian plate and the Black Sea trench.

In the north-western shelf of the Black Sea most wells are shut in in the sediments of the Upper Cretaceous. The exposed cross-section among all stages – Cenomanian, Turonian, Coniacian, Santonian, Campanian, Maastrichtian. Lower section is represented by the Albian stage only. Upper Cretaceous consists mainly of limestone with subordinate value of marl and chalk, rarely of clay, sandstone and volcanic formations. The thickness of sediments is up to 2400 m. Lower Cretaceous consists mostly of terrigenous rocks: argillites and sandstones with subordinate values of carbonate: marl and volcanic – tuffite. The thickness of sediments is up to 1000 m.

In the Sea of Azov waters the Cretaceous deposits are widespread almost everywhere except for the territory of Serednioazovske elevation where they found only in the Marine unit. Upper Cretaceous cross-section is represented by Cenomanian, Santonian, Campanian and Maastrichtian stages. Composition of stages differs significantly in volume, lithology, thickness and distribution of rocks. Deposits are represented by carbonate and terrigenous rocks. Among carbonate rocks predominate limestones and among terrigenous rocks predominate mudstones and sandstones. Full thickness traversed of the Upper Cretaceous sediments is about 950 m on Matroske elevation. Lower Cretaceous cross-section is presented by Alb deposits only. They are represented by terrigenous clay rocks – mudstones, siltstones and sandstones. Thickness traversed of the Lower Cretaceous sediments is about 200 m on Zakhidnobiriuche elevation.

According to the characteristic features of the geological structure of Cretaceous sediments in the north-western Black Sea shelf it was identified six structural-facial areas: Krylovskyi, Hubkinsko-Kiliisko-Zmiinyi, of Pivdennoukrainska monocline, Karkinitskyi, of Kraiovyi ledge and Kalamitskyi; three areas within the Ukrainian sector of the Sea of Azov: Pivnichnoazovskyi, Serednioazovskyi and Indolskyi.

Krylovskyi structural-facial area covers the territory of a deflection of the same name and is the marine continuation of Pereddobrudzkyi deflection. The area is not explored by drilling. Within this area, by analogy with a cross-section of Pereddobrudzkyi deflection, the Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented by the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion on the formations of

Криловський структурно-фаціальний район займає територію одніменного прогину і є морським продовженням Переддобрудзького прогину. Район не досліджений бурінням. На території району, за аналогією з розрізом Переддобрудзького прогину, крейдові відклади поширені суцільно і представлені утвореннями нижнього та верхнього віddілів. Вони залягають із розмивом на утвореннях юрської системи і перекриваються з переривом утвореннями палеогену чи неогену. Нижній віddіл представлений нормальними морськими теригенно-карбонатними відкладами баремського та аптського ярусів, верхній – карбонатними утвореннями сеноманського, коньякського, сantonського та кампанського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 140 м, верхньої до 250 м.

Губкінсько-Кілійсько-Змійний структурно-фаціальний район займає територію одніменної зони підняття. Район не досліджений бурінням. На території району крейдові відклади поширені суцільно і представлені утвореннями нижнього та верхнього віddілів. Вони залягають із розмивом на утвореннях юрської (?) системи і перекриваються з переривом утвореннями палеогену чи неогену. Нижній віddіл, ймовірно, представлений нормальними морськими теригенно-глинистими відкладами аптського (?) та альбського ярусів, верхній – теригенно-глинистими відкладами сеноману та теригенно-карбонатними утвореннями кампанського та маастрихтського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 500 м, верхньої до 520 м.

Структурно-фаціальний район Південноукраїнської монокліналі займає територію одніменного структурного елемента південно-західної околиці СЕП. На території району крейдові відклади поширені суцільно і представлені утвореннями нижнього та верхнього віddілів. Вони залягають із розмивом на утвореннях кристалічного фундаменту і перекриваються з переривом утвореннями палеогену. Нижній віddіл представлений нормальними морськими теригенно-карбонатними відкладами альбського ярусу, верхній – карбонатними утвореннями сеноманського, туронського, коньякського, сantonського, кампанського та маастрихтського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 170 м, верхньої до 1450 м.

Каркінітський структурно-фаціальний район займає територію одніменного структурного прогину Скіфської плити. На території району крейдові відклади поширені суцільно і представлені утвореннями нижнього та верхнього віddілів. Вони залягають із розмивом на утвореннях юрської (?) системи і перекриваються з переривом утвореннями палеогену. Нижній віddіл представлений нормальними морськими теригенно-глинистими відкладами аптського та альбського ярусів, верхній – карбонатними утвореннями сеноманського, туронського, коньякського, сantonського, кампанського та маастрихтського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 1000 м (?), верхньої до 2400 м.

Структурно-фаціальний район Крайового уступу займає територію одніменного структурного елемента Скіфської плити. На території району крейдові відклади поширені суцільно і представлені утвореннями нижнього та верхнього віddілів. Вони залягають із розмивом на утвореннях юрської (?) системи і перекриваються з переривом утвореннями палеогену. Нижній віddіл представлений нормальними морськими теригенно-глинисто-карбонатними відкладами баремського (?), аптського та альбського ярусів, верхній – карбонатними утвореннями сеноманського, кампанського та маастрихтського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 1000 м (?), верхньої до 380 м.

Каламітський структурно-фаціальний район займає територію одніменного підняття (валу) Скіфської плити. На території району

the Jurassic system and are overlapped with a break by Paleogene or Neogene formations. Lower section is represented by normal-marine terrigenous-carbonate sediments of Barremian and Aptian stages, and the upper section is represented by carbonate formations of Cenomanian, Coniacian, Santonian and Campanian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to 140 m, and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 250 m.

Hubkinsko-Kiliisko-Zmiinyi structural-facial area covers the territory of the elevations area of the same name. The area is not explored by drilling. Within this area the Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented by the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion on the formations of the Jurassic (?) system and are overlapped with a break by Paleogene or Neogene formations. Lower section is probably represented by normal-marine terrigenous-clayey sediments of the Aptian (?) and Albian stages, and the upper section is represented by terrigenous-clayey sediments of the Cenomanian stage and terrigenous-carbonate formations of the Campanian and Maastrichtian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to 500 m, and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 520 m.

Structural-facial area of Pivdenna monocline covers the territory of structural element of the same name in the southwestern suburb of EEP. Within this area the Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented by the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion on the formations of the crystalline foundation and are overlapped with a break by Paleogene formations. Lower section is represented by normal-marine terrigenous-carbonate sediments of the Albian stage, the upper section is represented by carbonate formations of the Cenomanian, Turonian, Coniacian, Santonian, Campanian and Maastrichtian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to 170 m and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 1450 m.

Karkinitskyi structural-facial area covers the territory of the structural deflection of the same name of the Scythian plate. Within this area the Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented by the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion on the formations of the Jurassic (?) system and are overlapped with a break by Paleogene formations. Lower section is represented by normal-marine terrigenous-clayey sediments of the Aptian and Albian stages, the upper section is represented by carbonate formations of the Cenomanian, Turonian, Coniacian, Santonian, Campanian and Maastrichtian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to 1000 m (?), and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 2400 m.

Structural-facial area of Kraiovyi ledge covers the territory of structural element of the same name of the Scythian plate. Within this area the Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented by the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion on the formations of the Jurassic (?) system and are overlapped with a break by Paleogene formations. Lower section is represented by normal-marine terrigenous-clayey-carbonate sediments of the Barremian (?), Aptian and Albian stages, the upper section is represented by carbonate formations of the Cenomanian, Campanian and Maastrichtian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to 1000 m (?) and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 380 m.

Kalamitskyi structural-facial area covers the territory of the elevation (swell) of the same name of the Scythian plate. Within this area the




Рис. Стратиграфічна схема крейдових відкладів українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів
Fig. Stratigraphic scheme of the Cretaceous sediments of the Ukrainian sector of the Black and Azov Seas

LOCAL STRATIGRAPHIC COLUMNS								ADJACENT REGIONS
BLACK SEA NORTHWESTERN SHELF					SEA OF AZOV, UKRAINIAN PART			STEPPE CRIMEA (Strat. charts of 1:500)
Kilia - Zmeiny Island	South Ukraine Monocline	Karkinit graben	Marginal Terrace	Kalamit Swell	North Azov	Central Azov	Indol Depression	(North Crimea region Northwestern sub-region)
Sandstones and limestones up to 70 m	Limestones with marl layers with <i>Cibicoides bembix</i> (Vfrss.), <i>Amalgagavelinella stellaria</i> (Vass.)	Limestones, marls, sometimes limestones with <i>Nephrolithus frequens</i> , etc., up to 360 m	White chalky limestones with <i>Bolivina incrassata crassa</i> (Reuss.), <i>Bolivinoides draco draco</i> Marss., <i>Orbitoididae</i> , etc.	Calcareous clayey siltstones with <i>Nephrolithus frequens</i> at the bottom up to 100 m	Limestones, marls, sometimes limestones with <i>Globotruncana stuarti</i> (Lapp.) and <i>Liraphidites</i> (Lapp.)	Gray calcareous anisomeric sandstones with <i>Globotruncana stuarti</i> (Lapp.)	Gray marls, tight, durable, micaceous, with <i>Globotruncana stuarti</i> Lapp., etc.	Upper sub-suite Gray marls with intercalation daye limestones, lenses of cherty rocks with <i>Abathomphalus mayaroensis</i> (Bdil), <i>Pseudotextularia varians</i> (Rzehak) up to 900 m
Limestones and sandstones up to 100 m	Limestones and sandstones with <i>Globotruncana stuarti</i> (Lapp.), <i>Marcalius nielsenae</i> up to 250 m	Pelitic limestones with <i>Globotruncana stuarti</i> (Lapp.)	up to 90 m	up to 60 m	up to 30 m		up to 100 m	
Limestones interbedded with sandstones up to 150 m	Clayey pelitic limestones with <i>Bolivina kalinini</i> Vass., <i>Globotruncata emydensis</i> Vass. up to 240 m	Clayey limestones, tight, fractured with <i>Globotruncana ventricosa</i> (White), <i>Globotruncana morozovae</i> (Vass.), <i>Brotzenella montereiensis</i> Marie, <i>Bolivina incrassata</i> (Rss.), <i>B.kalinini</i> (Vass.), <i>Broinsonia parca</i> parca, <i>Broinsonia parca</i> constricta up to 70 m	Calcareous siltstones with <i>Globotruncana cf. formicata</i> Plumm., <i>Brotzenella cf. cayeuxi</i> (Lapp.) up to 220 m	Limestones and marls with <i>Globotruncana morozovae</i> (Vass.) up to 45 m	Sands and sandstones calcareous with <i>Abathomphalus mayaroensis</i> (Bdil), <i>Pseudotextularia varians</i> (Rzehak), <i>Globotruncana stuarti</i> (Lapp.) up to 480 m	Light-gray pelitic limestones with <i>Brotzenella montereiensis</i> Marie i <i>Bolivinoides decoratus</i> (Jones) up to 220 m	Suite	Lower sub-suite Gray limestones, daye, interbedded with marls clays with <i>Bolivina kalinini</i> (Vass.), <i>Bolivina incrassata</i> (Rss.), <i>Brotzenella montereiensis</i> (Marie) up to 450 m
Sands and sandstones with limestone beds up to 200 m	Limestones and marls with <i>Micula stauropora</i> up to 150 m	Pelitic limestones with <i>Gavelinella clementiana clementiana</i> (Marie) up to 220 m	Pelitic limestones, tight, limestones, sometimes marbleous, with <i>Dicarinella concavata</i> (Brotz.), <i>Stensionia granulata</i> Olb., <i>Micula stauropora</i> up to 310 m up to 110 m	Limestone and marl with <i>Gavelinella clementiana clementiana</i> (Marie) up to 580 m	Kalamitska suite. Andesite and diabase porphyrites and their lavas up to 500 m	Sands and limestones with <i>Gavelinella clementiana clementiana</i> (Marie) up to 300 m	Not revealed by drilling	Polycoxa sequence Clayey limestones interbedded with marls with <i>Gavelinella clementiana</i> (Marie), <i>Micula stauropora</i> (Vass.), <i>Gavelinella clementiana</i> (Marie) in the bottom part up to 170 m
Shales and sandstones with <i>Rotalipora appenninica</i> (Renz.), <i>R. ticiensis</i> (Gand.) up to 80 m	Shales and sandstones with <i>Rotalipora appenninica</i> (Renz.), <i>R. ticiensis</i> (Gand.) up to 170 m	Black and dark-gray clayey limestones with <i>Rotalipora appenninica</i> (Renz.), <i>R. ticiensis</i> (Gand.), <i>Eiffelithus turriselliflli</i> , <i>Gartnerago segmentatum</i> , <i>Lithraplax acutus</i> , <i>Helenea chitastia</i> up to 350 m	Gray clayey limestones, sandy to gravel with <i>Rotalipora ticiensis</i> (Gand.), <i>Eiffelithus turriselliflli</i> , etc. in the upper part and clayey calcareous sandstones in the lower part up to 660 m	Limestones, sandstones, siltstones and shales with <i>Rotalipora appenninica</i> (Renz.), <i>R. ticiensis</i> (Gand.), <i>Eiffelithus turriselliflli</i> , <i>Orbitolinidae</i> up to 230 m	Limestones and shales with <i>Rotalipora globotruncanoides</i> (Sig.), <i>R. reicheli</i> (Morn.), <i>R. cushmani</i> (Morr.) up to 520 m	Limestones in the upper part and shales with <i>Rotalipora reicheli</i> (Morn.), <i>R. cushmani</i> (Morr.) up to 250 m	Krasnodarstanska suite	Light-gray limestones and white limestones, clayey, with sutures and stolites, sometimes porcelanites, silicified with clay interlayers with <i>Stensionia granulata</i> Olb. at the top and <i>Globotruncana tapparum</i> (Brotz.) at the bottom up to 1200 m
Not revealed by drilling	Not revealed by drilling	?	up to 80 m	up to 210 m	Dark-gray to black non-carbonate shales up to 110 m	up to 210 m	T ₂	Upper sub-suite Gray marl with <i>Rotalipora appenninica</i> (Renz.) up to 570 m
			up to 170 m	up to 300 m	Dark-gray to black non-carbonate shales with <i>Gavelinella intermediata</i> (Berm.) <i>Hedbergella trocoides</i> (Gand.) Top: up to 100 m	up to 530 m	Pr	Shale, sometimes volcanogenic rocks with <i>Protopycnus intermedius</i> (P.Linn.), <i>Planorhynchus bauxiticus</i> (Gand.) up to 590 m
		Not revealed by drilling	up to 80 m	up to 80 m	Dark-gray shales slightly calcareous with shales, volcanogenic sandstones, gravelstones, volcanic rocks with <i>Pervinqueria subinflata</i> (Pilk.) up to 160 m		T ₃	Lower sub-suite Dark-gray shales, volcanogenic sandstones, gravelstones, volcanic rocks with <i>Pervinqueria subinflata</i> (Pilk.) up to 170 m
			?				?	Tikhonovska suite Dark-gray shales interbedded with shales, sometimes effusive rocks, with <i>Hedbergella trocoides</i> (Gand.) up to 590 m

ну крейдові відклади поширені суцільно і представлені утвореннями нижнього та верхнього віddілів. Вони залягають із розмивом на утвореннях тріасової (?) системи і перекриваються з переривом утвореннями палеогену чи неогену. Нижній віddіл представлений нормальними морськими теригенно-глинистими відкладами аптського та альбського ярусів, верхній – карбонатними утвореннями сеноманського, сantonського, кампанського та маастрихтського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 1000 м (?), верхньої до 900 м.

Північноазовський структурно-фаціальний район займає територію однієїменного прогину південно-західної околиці СЕП. На території району крейдові відклади поширені суцільно і представлені утвореннями нижнього та верхнього віddілів. Вони залягають з розмивом на утвореннях кристалічного фундаменту (?) і перекриваються з переривом утвореннями палеогену. Нижній віddіл представлений нормальними морськими теригенно-глинистими відкладами аптського та альбського ярусів, верхній – теригенно-карбонатними утвореннями сеноманського та кампанського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 500 м (?), верхньої до 1000 м.

Середньоазовський структурно-фаціальний район займає територію однієїменного підняття (валу) Скіфської плити. На території району крейдові відклади поширені фрагментарно і представлені утвореннями лише верхнього віddілу. Вони залягають з розмивом на утвореннях тріасової системи (?) і перекриваються з переривом утвореннями палеогену. Верхній віddіл представлений нормальними морськими теригенно-глинистими відкладами сеноманського та карбонатними утвореннями кампанського та маастрихтського ярусів.

Товщина відкладів верхнього віddілу до 530 м.

Індольський структурно-фаціальний район займає територію однієїменної зони прогину Скіфської плити. Крейдові відклади району не досліджено бурінням. На території району крейдові відклади поширені суцільно і представлені утвореннями нижнього та верхнього віddілів. Вони залягають з розмивом на утвореннях юрської (?) системи і перекриваються з переривом утвореннями палеогену. Нижній віddіл, ймовірно, представлений нормальними теригенно-глинистими відкладами аптського (?) та альбського ярусів, верхній – теригенно-глинистими відкладами сеноману та карбонатними утвореннями туронського, коньякського, сantonського, кампанського та маастрихтського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 500 м (?), верхньої до 1500 м (?).

Результатом проведених досліджень є створена стратиграфічна схема (рисунок).

Висновки

На основі результатів регіональних сейсмічних досліджень із урахуванням усіх наявних геолого-геофізичних матеріалів та результатів буріння свердловин проведено стратиграфічне розчленування крейдових відкладів та пошарову їх кореляцію у межах акваторії дослідження та прилеглого суходолу.

За особливостями геологічної будови крейдових відкладів у межах українського сектора акваторії Чорного та Азовського морів виділено дев'ять структурно-фаціальних районів: шість на північно-західному шельфі Чорного моря (Криворізький, Губкінсько-Кілійсько-Зміїний, Південноукраїнської монокліналі, Каркінітський, Крайового уступу та Каламітський) та три (Північноазовський,

Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented by the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion on the formations of Triassic (?) system and are overlapped with a break by Paleogene or Neogene formations. Lower section is represented by normal-marine terrigenous-clayey sediments of the Aptian and Albian stages, the upper section is represented by carbonate formations of the Cenomanian, Campanian and Maastrichtian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to 1000 m (?) and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 900 m.

Pivnichnoazovskyi structural-facial area covers the territory of deflection of the same name of the southwestern suburb of EEP. Within this area the Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented by the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion on the formations of the crystalline foundation (?) and are overlapped with a break by Paleogene formations. Lower section is represented by normal-marine terrigenous-clayey sediments of the Aptian and Albian stages, the upper section is represented by terrigenous-carbonate formations of the Cenomanian and Campanian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to 500 m (?) and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 1000 m.

Serednioazovskyi structural-facial area covers the territory of the elevation (swell) of the same name of the Scythian plate. Within this area the Cretaceous deposits are distributed fragmentarily and are represented by formations of the upper section only. They lie with erosion on the formations of the Triassic system (?) and are overlapped with a break by Paleogene formations. Upper section is represented by normal-marine terrigenous-clayey deposits of the Cenomanian stage and by carbonate formations of the Campanian and Maastrichtian stages.

The thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 530 m.

Indolskyi structural-facial area covers the territory of deflection of the same name of the Scythian plate. Cretaceous deposits of the area has not been explored by drilling. Within this area the Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented by the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion on the formations of the Jurassic (?) system and are overlapped with a break by Paleogene formations. Lower section is probably represented by normal-marine terrigenous-clayey sediments of the Aptian (?) and Albian stages, the upper section is represented by terrigenous-clayey sediments of the Cenomanian stage and by carbonate formations of the Turonian, Coniacian, Santonian, Campanian and Maastrichtian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to 500 m (?) and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 1500 m (?).

The result of the research is a stratigraphic scheme (Figure).

Summary

On the basis of the results of regional seismic surveys considering all available geological and geophysical data and results of drilling wells a stratigraphic dissection of Cretaceous sediments and their layered correlation was carried out within the water areas of research and adjacent land.

According to the geological structure of Cretaceous sediments within the Ukrainian sector of the Black and Azov Seas waters nine structural-facial areas were identified: six on the north-western shelf of the Black Sea (Krylovskyi, Hubkinsko-Kiliisko-Zmiinyi, of Pivdennoukrainska mono-

Середньоазовський та Індольський) у межах українського сектора Азовського моря.

Створено та запропоновано до розгляду региональну стратиграфічну схему крейдових відкладів української частини акваторій Чорного та Азовського морів, що доцільно застосувати як основу для подальших геологорозвідувальних робіт на нафту та газ.

cline, Karkinitskyi, of Kraiovyi ledge and Kalamitskyi) and three (Pivnichnoazovskyi, Serednioazovskyi and Indolskyi) within the Ukrainian sector of the Sea of Azov.

A regional stratigraphic scheme of Cretaceous sediments if the Ukrainian part of the Black Sea and Sea of Azov waters was created and offered for consideration that should be reasonably used as a basis for further exploration for oil and gas.

Список літератури\ References

1. **Астахова Т.В.** Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и побережья Чёрного моря / Т.В. Астахова, С.В. Горак, Е.Я. Краева [и др]. – К.: Наук. думка, 1984. – 184 с.
2. **Гожик П.Ф.** Нафтогазоперспективні об'єкти України. Наукові і практичні основи пошукув родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря / Гожик П.Ф. [та ін.]. – К.: ЕКМО, 2007. – 232 с.
3. **Гожик П.Ф.** Нафтогазоперспективні об'єкти України. Теоретичне і практичне обґрунтування пошукув нафти і газу в акваторіях України / Гожик П.Ф. [та ін.]. – К.: ЕКМО, 2010. – 200 с.
4. **Гожик П.Ф.** Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / П.Ф. Гожик, Н.В. Маслун, Л.Ф. Плотнікова, М.М. Іванік [та ін.]. – К.: Логос, 2006. – 171 с.
5. **Гожик П.Ф.** Геолого-структурно-термоатмогеохімічне обґрунтування нафтогазоносності Азово-Чорноморської акваторії / П.Ф. Гожик, І.Д. Багрій, З.Я. Войцицький [та ін.]. – К.: Логос, 2010. – 419 с.
6. **Гордиевич В.А.** Новые данные о геологическом строении шельфа Чорного моря по результатам бурения скважины на Ильичевской структуре / В.А. Гордиевич // Тектоника і стратиграфія. – 1984. – Вип. 25. – С. 60–65.
7. **Іщенко І.І.** Літолого-петрографічні особливості крейдових карбонатних колекторів північно-західного шельфу Чорного моря / І.І. Іщенко, Л.М. Якушин. – Гурзуф, 2007. – С. 137–139.
8. **Іщенко І.І.** Встановлення переривів в осадконакопиченні у крейдових розрізах свердловин північно-західного шельфу Чорного моря / І.І. Іщенко, Л.М. Якушин, Л.Ф. Плотнікова // Тектоника і стратиграфія. – 2007. – Вип. 35. – С. 113–124.
9. **Плотнікова Л.Ф.** К стратиграфии меловых отложений северо-западного шельфа Чёрного моря / Л.Ф. Плотнікова // Биостратиграфические и палеоэкологические аспекты событийной стратиграфии. – К., 2000. – С. 32–33.
10. **Плотнікова Л.Ф.** Новые данные по стратиграфии меловых отложений Украинского щита / Л.Ф. Плотнікова, Л.Н. Якушин // Еволюція органічного світу як підґрунтя для вирішення проблем стратиграфії. – К., 2002. – С. 62–64.
11. **Плотнікова Л.Ф.** О возрасте стратотипических разрезов каменнонебродской свиты и причепиловских слоёв Северного Донбасса / Л.Ф. Плотнікова, Л.Н. Якушин // Палеонтологічне обґрунтування стратонів фанерозою України. – К., 2001. – С. 47–49.
12. **Плотнікова Л.Ф.** Детальна стратифікація нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / Л.Ф. Плотнікова, Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Биостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. – К., 2005. – С. 75–80.
13. **Плотнікова Л.Ф.** До питання про палеогеографічні умови формування осадових комплексів північно-західного шельфу Чорного моря у пізньокрейдовий час / Л.Ф. Плотнікова, Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – 2006. – Вип. 20. – С. 43–54. – (Серія Геологія).
14. **Плотнікова Л.Ф.** Нові дані про стратиграфію нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / Л.Ф. Плотнікова, Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Тектоніка і стратиграфія. – 2005. – Вип. 34. – С. 93–99.
15. **Плотнікова Л.Ф.** Нові дані про стратиграфію сеноманських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / Л.Ф. Плотнікова, Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Сучасні напрямки української геологічної науки. – К., 2005. – С. 249–255.
16. **Плотнікова Л.Ф.** Особливості розвитку Причорномор'я в пізньокрейдову епоху / Л.Ф. Плотнікова // Тектоніка і стратиграфія. – 1972. – Вип. 2. – С. 71–81.
17. **Плотнікова Л.Ф.** Стратиграфія крейдово-палеоценових відкладів та особливості геологічного розвитку західної частини північно-західного шельфу Чорного моря / Л.Ф. Плотнікова // Геол. журн. – 2003. – № 2. – С. 27–39.
18. **Сеньковський Ю.М.** Геологічна палеоокеанографія океану Тетіс (Карпато-Чорноморський сегмент) / Ю.М. Сеньковський, К.Г. Григорчук, В.П. Гнідець, Ю.В. Колтун. – К.: Наук. думка, 2004. – 171 с.
19. **Сеньковський Ю.М.** Палеоокеанографія Карпатського мелового апвелінга / Ю.Н. Сеньковський // Геол. журн. – 1978. – Т. 38, № 6. – С. 54–64.
20. **Стратиграфічний кодекс України.** – К., 1997. – 39 с.
21. **Шнюков Е.Ф.** Геология шельфа УССР. Литология / Е.Ф. Шнюков, В.И. Мельник, Ю.И. Иномецев. – К.: Наук. думка, 1985. – 189 с.
22. **Шумник А.В.** Биостратиграфія верхньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря і кримського континентального схилу за нанофосіліями / А.В. Шумник // Геологічний журнал. – 2001. – № 3. – С. 96–105.
23. **Шумник А.В.** Вапняковий нанопланктон верхньої крейди Південної України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук: спец. 04.00.09 «Палеонтологія та стратиграфія» / А.В. Шумник. – К., 2002. – 19 с.
24. **Шумник А.В.** Розчленування верхньокрейдових відкладів Східного Приазов'я за вапняковим нанопланктоном / А.В. Шумник // Еволюція органічного світу як підґрунтя для вирішення проблем стратиграфії. – К., 2002. – С. 58–62.

