

## УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ КУКУРДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ БІОГАРНОМ НА ОСУШУВАНИХ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ

*К. В. Поліщук, науковий співробітник<sup>1</sup>  
Інститут водних проблем і меліорації НААН*

*Наведено результати досліджень з ефективності використання бактеріального препарату біогран під час вирощування кукурудзи на зелену масу та за використання різних систем удобрення. Установлено позитивний вплив цього препарату на поживний режим ґрунту та врожайність.*

**Біогран, урожайність, поживний режим ґрунту, кукурудза на зелену масу**

Технології вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням вимог збереження довкілля зараз є досить розповсюдженими. Упровадження таких технологій дає змогу залучати потенціал агроекосистем з мінімальними використанням засобів хімізації [2–4]. Одним з таких заходів у технології вирощування зернових культур є використання бактеріальних препаратів, але питання інокуляції кукурудзи не достатньо вивчене, оскільки в нашій країні широко застосована обробка насіння засобами хімізації на заводах, а також внесення високих норм мінеральних добрив.

**Мета дослідження** – вивчити ефективність бактеріального препарату біогран шляхом активізації асоціативної азотфіксації біологічного азоту на меліорованих ґрунтах.

**Матеріали і методи дослідження.** Дослідження проводили протягом 2010–2012 рр. у стаціонарному польовому досліді на базі дослідного господарства «Перше травня» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції в Рожищенському районі Волинської області.

Площа посівної ділянки – 96 м<sup>2</sup>, облікової ділянки – 50 м<sup>2</sup>. Повторення досліду 3-разове. Схема досліду включає такі системи удобрення: контроль (без добрив), мінеральна ( $N_{100}P_{90}K_{100}$ ), органо-мінеральна ( $N_{100}P_{90}K_{100}$ +гній) та біологічна (гній + сидерат). В основу досліджень покладено ланку зерно-кормової 5-типільної сівоміні (трави багаторічні, пшениця озима, ячмінь ярий, однорічні трави, кукурудза на зелену масу). Агротехніка вирощування кукурудзи – загальноприйнята для зони Полісся. У досліді для сівби використовували сорт Переяславський 230.

Грунт дослідної ділянки дерново-підзолистий супіщаний глейовий, який характеризується такими показниками родючості: вміст гумусу в орному шарі становить 1,4 %; pH сольової витяжки – 5,0; кількість сполук азоту, що

<sup>1</sup> Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор І. Т. Слюсар.

© К. В. Поліщук, 2013

гідролізуються, – 56 мг/кг ґрунту; вміст рухомого фосфору – 174 мг/кг ґрунту і обмінного калію – 78 мг/кг ґрунту.

Інокуляцію насіння проводили в день посіву нанесенням бактеріального препарату біогран<sup>2</sup> на насіння з розрахунку 200 г на гектар(обробку насіння проводили вручну).

Рівні ґрутових вод визначали у водомірних колодязях через кожні п'ять днів протягом вегетації. Поживний режим ґрунту визначали в шарі ґрунту 0–20 см; сполуки азоту, що гідролізуються визначали за методикою Корнфілда; рухомий P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> та обмінний K<sub>2</sub>O – за Кірсановим. Статистичний і математичний аналіз експериментальних даних проводили шляхом застосування дисперсійного, кореляційного й регресійного аналізів за методикою Доспехова [1].

Погодні умови 2010 ріку були теплими з середньою за період вегетації температурою повітря + 16,8 C° за норми + 14,7 C°, вологозабезпеченістю 478 мм за норми 360 мм, у 2011 році відбувалося істотне коливання метеорологічних показників, за вологозабезпеченістю цей рік був досить посушливим: у травні випало лише 23 мм опадів за норми 60 мм. 2012 рік був помірно теплий, але окремі місяці (травень – липень). Період активної вегетації кукурудзи на зелену масу, відзначався контрастністю температурного режиму 15,9–21,9C° з достатньою вологозабезпеченістю 530 мм опадів.

**Результати дослідження та їх аналіз.** Дослідження поживного режиму ґрунту показали, що бактеріальний препарат біогран позитивно впливав на вміст рухомих сполук макроелементів за всіма системами удобрення (табл. 1).

### 1. Вміст поживних речовин у шарі ґрунту 0–20 см на посівах кукурудзи залежно від різних систем удобрення (середнє значення за вегетацію 2010–2012 рр., мг/кг ґрунту)

Система удобрення	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
	без інокуляції		
Контроль (без добрив)	58,9	78	38
Мінеральна система (N <sub>100</sub> P <sub>90</sub> K <sub>100</sub> )	69,5	121	68
Органо-мінеральна система (гній 50 т/га + N <sub>100</sub> P <sub>90</sub> K <sub>100</sub> )	78,8	180	93
Біологічна система (гній 50 т/га, сидерат)	72	163	67
з інокуляцією			
Контроль (без добрив) + біогран	60,9	82	37
Мінеральна система (N <sub>100</sub> P <sub>90</sub> K <sub>100</sub> + біогран)	72,5	134	70,6
Органо-мінеральна система (гній 50 т/га + N <sub>100</sub> P <sub>90</sub> K <sub>100</sub> + біогран)	80,3	191	94,6
Біологічна система (гній 50 т/га, сидерат + біогран)	74,7	168	69,6

<sup>2</sup>Склад: Azospirillum lipoferum 4014, біогумус, макроелементи та мікроелементи у хелатованій формі

Найбільший вміст на дослідних ділянках без внесення біограну сполук азоту, що гідролізується, отримали за органо-мінеральної системи удобрення (78,8 мг/кг ґрунту). Біологічна система удобрення привела до підвищення вмісту азоту на 13 мг/кг ґрунту проти контролю 58,9 мг/кг. Найменший вміст рухомого азоту в ґрунті був за мінеральної системи удобрення ( $N_{100}P_{90}K_{100}$ ), за якої вміст цього елементу збільшився на 18 % порівняно з контролем.

Внесення біограну забезпечило підвищення вмісту сполук азоту, що гідролізується в ґрунті, за застосування мінеральної та біологічної системи на 3,8–4,0 %, а на ділянках без добрив та за органо-мінеральної системи збільшення було в межах точності досліду.

Спостереження за фосфорним режимом без внесення біограну показали, що найбільший вміст рухомих сполук фосфору був за органо-мінеральної системи удобрення – 180 мг/кг, а в контрольному варіанті 78 мг/кг ґрунту. Застосування лише органічних добрив підвищувало вміст рухомого фосфору в ґрунті до 163 мг/кг ґрунту, що на 85 мг/кг більше від контролю. Найнижчим результат був на ділянках за мінеральної системи удобрення – 121 мг/кг ґрунту.

Передпосівна інокуляція насіння мікробіологічним препаратом біогран забезпечувала покращення фосфорного живлення інокульованих рослин на 3,1–10,7 %, оскільки коренева система рослини здатна проникати на значні глибини, залучаючи до рослинного метаболізму фосфати, які не можуть бути використані ними за інших умов. Особливо за біологічної та органо-мінеральної систем удобрення це дозволило забезпечити ґрунт високим вмістом рухомого фосфору (168–191 мг/кг ґрунту).

На вміст обмінного калію в ґрунті також позитивно, порівняно з контролем, впливали різні системи добрив. Так, за використання мінеральних добрив та гною відбувається підвищення вмісту обмінного калію в ґрунті до 93 мг/кг ґрунту, що на 55 мг/кг вище за контроль.

За впровадження мінеральної та біологічної систем удобрення вміст обмінного калію в ґрунті підвищувався на 29–30 мг/кг. На ділянках з передпосівною бактеризацією насіння біограном позитивний ефект від його застосування не спостерігали в накопиченні обмінного калію в ґрунті.

Встановлено, що інокуляція насіння бактеріальним препаратом, забезпечила приріст врожайності зеленої маси кукурудзи за всіх систем удобрення (табл. 2).

## 2. Вплив систем удобрення та інокуляції насіння біограном на врожайність зеленої маси кукурудзи, т/га

Система удобрення	2010	2011	2012	Середнє	Приріст ±
без інокуляції					
Контроль (без добрив)	25,1	37,3	34,1	32,1	-
Мінеральна система ( $N_{100}P_{90}K_{100}$ )	35,7	45,6	53,7	45,0	-
Органо-мінеральна система (гній 50 т/га + $N_{100}P_{90}K_{100}$ )	37,1	44	49,3	43,5	-
Біологічна система (гній 50 т/га,	32,5	41,3	42,4	38,7	-

сидерат)

	з інокуляцією				
Контроль (без добрив) + біогран	27,3	42,6	36,2	35,4	3,3
Мінеральна система ( $N_{100}P_{90}K_{100}$ + біогран)	39,6	48,3	52,8	46,9	1,9
Органо-мінеральна система (гній 50 т/га + $N_{100}P_{90}K_{100}$ + біогран)	39,7	48,1	53	46,9	3,4
Біологічна система (гній 50 т/га, сидерат + біогран)	36,9	48	50,1	45,0	6,3
<i>HIP<sub>05</sub>, т/га</i>					4,43

Найвищу врожайність на ділянках без бактеризації насіння забезпечила мінеральна система удобрення, її приріст склав 12,9 т/га порівняно з контролем 32,1 т/га. Найменший приріст отримали за використання гною та сидерату – 6,6 т/га. Приріст від органо-мінеральної системи з використанням  $N_{100}P_{90}K_{100}$  та 50 т/га гною склав – 11,4 т/га.

Найкраще біогран, спрацював за мінеральної ( $N_{100}P_{90}K_{100}$ ) та органо-мінеральної ( $N_{100}P_{90}K_{100}$ +гній) систем удобрення, а її врожайність виявилась на рівні 40,6 т/га, що на 14,7 т/га перевищувало контроль.

Біологічна система удобрення на кукурудзі (зелена маса) із застосуванням гною та сидерації в поєднанні з інокуляцією насіння біограном давала змогу отримати приріст до контролю на рівні 12,8 т/га. Такий же приріст був і за мінеральної системи удобрення без інокуляції насіння біограном. Якщо порівнювати біологічну систему удобрення з інокуляцією насіння препаратом і без, то препарат забезпечив приріст урожайності в 2 рази вищу, або на 6,3 т/га.

**Висновки.** Установлено, що інокуляція насіння кукурудзи біограном стимулює біологічну активність ґрунту, створює сприятливі умови для накопичення поживних речовин, підвищується вміст мікроелементів, зокрема вміст сполук азоту, що гідролізується, підвищився на 3–5 %, фосфору – 3–10 %, а вміст обмінного калію мало змінився порівняно з ділянками, на яких біогран не застосовувався. Крім того доведено, що біологічна система удобрення за інокуляції насіння препаратом підвищує врожайність культури на 6,3 т/га, інші варіанти давали приріст у межах похибки досліду: за мінеральної – 1,9 т/га, органо-мінеральної – 3,4 т/га.

### Список літератури

1. Доспехов В. А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / В. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.
2. Канівець В. І. Життя ґрунту / В. І. Канівець. – К. : Урожай, 1990. – 160 с.
3. Носко Б. С. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва / Б. С. Носко. – К. : Аграрна наука, 1999. – 98 с.
4. Слюсар І. Т. Сільськогосподарське використання осушених земель в гумідній зоні України та заходи, щодо їх збереження / І. Т. Слюсар, В. В. Метелюк // Збірник наук. праць Ін-ту землеробства УААН. – К., 1999. – Вип. 1–2. – С. 62–64.

Приведены результаты исследований по эффективности использования бактериального препарата биогран при выращивании кукурузы на зеленую массу и использование различных систем удобрения. Установлено положительное влияние этого препарата на питательный режим почвы и урожайность.

**Биогран, урожайность, питательный режим почвы, кукуруза на зеленую массу.**

*It is given the research results on the efficiency of "Biogran" bacterial preparation in the process of corn silo cultivating when using various fertilizer systems. It is determined a positive effect of the preparation on the soil nutritive regime and yield.*

***Biogran, yield, soil nutritive regime, corn silo.***