

орских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений.— М.: Колос, 1980.— 111 с.

3. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников.— М.: Колос, 1981.— 255 с.

Відділ розведення і генетики тварин  
Племзавод агрофірми "Галичина"

показаны результаты исследований воспроизводственного скрещивания симментальских коров с голштинскими производителями красно-пестрой масти, разделявшимися до рекордных удоев в контрольно-селекционных коровниках, оценки животных по генотипам и формирования генеалогической структуры стада.

УДК 636.22/28.082

П. МОЖИЛЕВСЬКИЙ, О. Т. БУСЕНКО, М. І. ШЕВЧЕНКО

## ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНО-РЯБИХ ГОЛШТИНІВ ДЛЯ СХРЕЩУВАННЯ ІЗ СИМЕНТАЛЬСЬКОЮ ХУДОБОЮ

Дано аналіз результатів схрещування червоно-рябих голштинів з маточним поголів'ям симентальської породи із помісями генотипу симентальськах монбельядськах кровності. Встановлено, що використання напівкровних плідників за голштинською породою на симентальських матках не сприяє поліпшенню молочної продуктивності їх дочок у порівнянні з матерями.

В господарствах України ще на початку 80-х років використання червоно-рябих голштинів планувалось для поліпшення молочної продуктивності симентальської худоби. Червоно-рябих плідників симентальської породи планували використати на матках генотипу симентальськах  $\times$   $3/4$  монбельядська та  $1/2$  симентальськах  $\times$   $1/2$  монбельядська і довести умовну частку крові червоно-рябої голштинської до близько 25 % (Майборода М. М., Самусенко А. І., 1981). Проте цей план оказался неефективним. Було вирішено (Зубець М. В., Буркат В. П., Ханджян Ф. та ін., 1985) шляхом відтворного схрещування сименталів (маточньої породи) в племінних заводах (з

© Можилевский П. Л. , Бусенко О. Т., Шевченко М. І., 1996

Розведення і генетика тварин. 1996. Вип. 28.

червоно-рябими голштинами вивести українську червоно-рябу породу, тварині якої б несли в собі не менше 75—82 % спадковості червоно-рябих голштинів.

**Методика досліджень.** За матеріалами племінного і зоотехнічного обліку племінного заводу колгоспу "10-річчя Жовтня" вивчали молочну продуктивність дочок чистопородних і помісних плідників за голштинською породою у порівнянні з матерями цих дочок.

**Результати досліджень.** У племінному заводі колгоспу "10-річчя Жовтня" з 1979 року також широко використовується сперма бугаїв-плідників червоно-рябої голштинської породи з метою подальшого підвищення генетичного потенціалу молочності стада, виведення нової молочної породи. Плідники голштинської породи використовувалися і використовуються на чистопородному маточному поголів'ї симентальської породи та на помісях генотипу симентальськах монбель-ярдська різної кровності.

Найбільшу кількість помісного маточного поголів'я в племзаводі одержано від голштинських бугаїв лінії Рефлекшн Совріна 0198998. З 1979 року в племзаводі для осіменіння корів використовували сперму чистопородного бугая Техаля 1726749 лінії Рефлекшн Совріна (продуктивність матері — 2-4-6291 кг молока з вмістом жиру 4,1 %, продуктивність матері батька — 5-9845 — 4,65 %). Від дочок Техаля за першу лактацію одержано в середньому по 4751 кг молока з вмістом жиру 4,05 %, а від їх матерів (чистопородних сименталів) за першу лактацію в середньому надоєно по 6426 кг молока жирністю 3,93 %. Дочки Техаля завищуючи лактацію також дещо поступались своїм матерям.

Більш широко використовувалися чистопородні червоно-рябої голштинської породи плідники Ред 916, Ецлес 327, Ребус 099685. Від 20 дочок бугая Реда 916 (продуктивність матері — 4-8007-4,0) за першу лактацію в середньому одержано по 3856 кг молока при 3,91 % жиру. Як свідчать наведені дані (табл. 1) дочки бугая Реда за надоєм поступалися ровесницям і своїм матерям.

З 1980 року на маточному поголів'ї племзаводу широко використовували бугаї-плідника Ецлеса 327 лінії Рефлекшн Соврін (продуктивність матері — 7434 — 3,91 %). Від 147 дочок Ецлеса за першу лактацію в середньому надоєно по 3810 кг молока з вмістом жиру 3,91 %. По надою за першу лактацію його дочки поступались ровесницям на 205 кг при схожому жиру в молоці, а своїх матерів вони перевершили як по надою, так і вмісту жиру ( $\Delta M = +340+0,02$ ).

Аналіз продуктивних якостей дочок Ецлеса свідчить, що якщо за першу лактацію вони значно переважали своїх метрів ( $P < 0,01$ ), то за вищу лактацію — поступались їм. Так, від урахованих 68 дочок Ецлеса за вищу лактацію в середньому одержано по 5288 кг молока з вмістом жиру 3,95 %, а від їх матерів — відповідно 5420 кг і 3,93 %. Лише 20

із 68 або 29,4 % за кращу лактацію дали понад 6000 кг молока. 9 корів-рекордисток симентальської породи з удеом понад 7000 кг молока не тільки не перевершили дочок Ецлеса, але жодна з них не досягла рівня продуктивності своєї матері. Середня продуктивність 9-ти дочок Ецлеса і корів-рекордисток симентальської породи за кращу лактацію становила відповідно 6636 і 8546 кг молока.

Найбільш високопродуктивною дочкою Ецлеса була Маркіза 1150 з генотипу 1/2 голштинськах 1/2 симентальська. Перший раз вона отелилась у 30-місячному віці. За 305 днів, або укорочену лактацію, від якої дочі одержано:

Перша лактація	—	8109	кг з вмістом жиру	4,02 %
Друга	"	9458	"	3,99
Третя	"	10710	"	3,86
Четверта	"	9127	"	4,24

Проте за продуктивністю вона не досягла рівня своєї матері. Мати Маркізи рекордистка Медолова 9204 (2-305-11360-3,85) є внучкою рекордистки Мальвіни 2843 (4-305-14585-3,94) родини Ецлесівки 456.

Задовільно відомо, що рівень молочної продуктивності первісток першого покоління залежить від віку першого отелення. 51 дочка Ецлеса, або 34,7 % всього поголів'я, отелилась у віці 32 місяців і старше, в середньому у 37 місяців.

Варто також відзначити, що від дочок Техаля, Реда, Ецлеса і Ребуса (всі з племінів), котрі одержані від матерів, які за першу лактацію дали молоко з вмістом жиру 4,0 % і вище, одержано молоко нижчої якості, ніж у їх матерів.

Самим виявився бугай Ребус 099685 голштинської червоно-рябої масті (лінії Уширунг), завезений із ФРН на Прилуцьке МРПО. Продуктивність його матері — 4-305-7811-4,29. Від 39-ти дочок Ребуса за першу лактації в середньому одержано по 4155 кг молока жирністю 3,86 %. Дочки Ребуса за першу лактацію перевершували ровесниць на 1000 кг і своїх матерів — на 497 кг, вони більш різноманітні за продуктивністю у порівнянні з дочками Ецлеса й Реда і мають ряд істотних фізических вад.

До ровесниць чистопородних бугаїв голштинської породи віднесені дочіки мацадки чистопородних бугаїв тієї ж породи: ровесниці дочок Ецлеса — дочки Реда і Ребуса; дочок Реда — дочки Ецлеса і Ребуса; дочок Ребуса — дочки Ецлеса і Реда.

При цьому змінюється оцінка цих плідників при порівнянні надояв корів-першісток не 1/2, а 3/4-кровних за голштинською породою. На 1.01.1990 р. в племзаводі корів генотипу 3/4-кровних за голштинами було в наявності 32, з них нормально закінчили першу лактацію 19. Від них за першу лактацію в середньому одержано по 3974 кг молока з вмістом жиру 3,86 % (табл. 2).

**1. Характеристики буйтів-племінників червоного-різової палітнинської породи за молочного продуктивністю їх дочок**

Клічка, індивідуальний номер буята	Продуктивність дочок			Продуктивність матерів дочок			Продуктивність ро восениль		
	п	Нагіт, кг <i>M±m</i>	Вміст жиру, % <i>M±m</i>	Нагіт, кг <i>M±m</i>	Вміст жиру, % <i>M±m</i>	п	Нагіт, кг <i>M±m</i>	Вміст жиру, % <i>M±m</i>	
Ецлес 327	147	3810±81	3,91±0,014	3470±80	3,89±0,015	59	4015±174	3,91±0,01	
Ред 916	20	3856±223	3,91±0,013	4045±275	3,89±0,014	186	3930±85	3,91±0,01	
Ребус 099685	39	4115±184	3,91±0,012	3618±146	3,94±0,013	167	3815±88	3,91±0,01	

**2. Продуктивність корів-першісток 3/4-кровних за голівними**

Клічка, індивідуальний номер буята	Продуктивність			Іх матерів			за нагітом, кг			за вмістом жиру, %		
	дочок	нагіт, кг	вміст жиру, %	нагіт, кг	вміст жиру, %	нагіт, кг	вміст жиру, %	нагіт, кг	вміст жиру, %	за нагітом, кг	за вмістом жиру, %	
Ецлес 327	4305	3,64		3815		3,84		+490		-0,2		
Ред 916	4377	3,85		4884		3,93		-507		-0,08		
Ребус 099685	3800	3,90		4302		3,95		-502		-0,05		

Наведені показники свідчать, що дочки Ребуса генотипу 3/4 за голштинською породою значно поступалися за надоєм матерям, тоді як дочки 1/2-кровності за голштинами перевищували за цією критикою як своїх матерів, так і ровесниць.

З 1989 року маточне поголів'я (корови і телиці) генотипу 3/4-кровності за голштинами осіменяли спермою бугаїв-плідників такої ж кровності (Роднік 7357 і Мудрий 3489).

Роднік 7357 лінії Рефлекшн Сорвін народився у держплемзаводі ім. Жовтня Київської області. Він походить від рекордистки 8419 (половинні кровної за голштинською породою), яка за четверту лактацію дала 9189 кг молока жирністю 3,87 %. Батько Родніка — бугай Імпрувер 333471 лінії Рефлекшн Сорвін (чистопородний голштин), мати якого за п'ятьшу лактацію дала 9154 кг молока жирністю 3,79 %.

Другий плідник, Мудрий 3439 лінії Рефлекшн Сорвін, народився у держплемзаводі "Христинівський" Черкаської області. Продуктивність матері за п'ятьшу лактацію — 7095 кг молока з вмістом жиру 3,83 %, а продуктивність матері батька — 9246 і 4,30 відповідно.

Іншальний огляд тварин і спостереження свідчать, що помісні матері генотипу 1/2 і 3/4-кровності за голштинами у порівнянні із симменталями мають більш виражений молочний тип, добре розвинене м'язове вим'я, краще пристосоване до машинного дойння, тварини спокійного норову.

У стаді племзаводу також використовувались напівкровні за голштинською породою плідники. Від 47-ми дочок таких плідників генотипу 1/4 голштинська х 3/4 симментальська за першу лактацію отримано в середньому по 3645 кг молока жирністю 3,91 %, а від їх матерів — відповідно 3695 і 3,96. Наведені дані свідчать про те, що наші дочки плідників генотипу 1/2 за голштинською породою не сприяли підвищенню молочної продуктивності у порівнянні зі своїми матерями.

**Висновок.** Дочки, одержані від чистопородних і помісних плідників червоно-рябої голштинської породи, як правило, поступаються за молочною продуктивністю своїм чистопородним симментальським материм.

1. Майборода Н. Н., Самусенко А. И. Методические рекомендации по созданию внутрипородного типа симментальского скота.— К., 1981.— 11 с.

2. Рекомендации по осуществлению программ создания красно-пестрой мясной породы крупного рогатого скота в хозяйствах Украинской ССР / М. В. Буркат, В. П. Буркат, А. Ф. Хаврук и др.— К.: Урожай, 1985.— 41 с.

Львівський аграрний університет

Аналіз результатов скрещивания красно-пестрых голштінів с маточным поголів'ям симментальської породи і з помесями генотипа симментальських голштінів різної кровності. Установлено, що використання напівкровних плідників по голштинській породі на симментальських матках не сприяє підвищенню продуктивності їх дочерей по сравнению с матерями.