

© А. Ю. УСЕНКО, Е. П. ДМИТРЕНКО

ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова" НАМН Украины

Особенности лапароскопической фундопликации

A. YU. USENKO, E. P. DMYTRENKO

SI "National Institute of Surgery and Transplantation by O. O. Shalimov" of NAMS of Ukraine

FEATURES OF LAPAROSCOPIC FUNDOPLICATION

В исследовании представлены результаты обследования и хирургического лечения 85 больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Всем больным в плановом порядке была выполнена лапароскопическая круорофия и фундопликация. У 3 (3,6 %) пациентов зарегистрирован рецидив заболевания, у 1 из них через 2 года после операции, у 2 через 5 лет. У всех больных рецидив грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) наблюдался у пациентов со смешанной ГПОД. Лапароскопическая фундопликация является эффективным методом лечения больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

The study presents the results of research and surgical treatment of 85 patients with gastroesophageal reflux disease with concomitant hiatal hernia. All patients routinely underwent laparoscopic fundoplication and crurophy. In 3 (3.6 %) patients the recurrent disease was registered, and 1 of them 2 years after surgery, 2 in 5 years. In all patients relapse of hiatal hernia and GERD was observed in patients with of hiatal hernia of type III. Laparoscopic fundoplication is an effective method of treatment of patients with gastroesophageal reflux disease on the background of hiatal hernia.

Постановка проблемы и анализ последних исследований и публикаций. Первая в мире лапароскопическая фундопликация была выполнена относительно недавно Dallemagne и соавт. в 1991 г., которая и в настоящее время остается одной из самых распространенных методик [1, 2].

На сегодняшний день успешные результаты после лапароскопической фундопликации достигают в 85–95 % [3, 4] случаев, и эта операция хорошо переносится пациентами [5].

Но у 4–18 % больных, по данным различных авторов, выполняются повторные операции в сроки наблюдения до 10 лет. Самая высокая частота повторных операций регистрируется в течение 1 года после операции (1,7 % в год) и неуклонно уменьшается в течение следующих 4 лет, достигая 0,5 % в год [6–8].

Анализ основных причин повторных антирефлюксных операций показал, что наиболее частыми показаниями являлись: рецидив рефлюкса (в 41,7 % случаев), дисфагия (16,6 %). У 4,0 % пациентов, перенесших повторную операцию, отмечался рецидив рефлюкса в сочетании с дисфагией. В своих наблюдениях Satarci послеоперационную дисфагию наблюдал у 16,8 % после фундопликации по Ниссену и у 9,3 % пациентов после фундопликации по Тупе [4].

Ранее считалось, что с целью снижения частоты послеоперационной дисфагии у пациентов с нарушенной моторикой пищевода методом выбора является частичная фундопликация [9]. Однако результаты рандомизированного клинического исследования говорят о преимуществах полной "короткой" фундопликации [10]. Повышение надежности антирефлюксного механизма при фундопликации по Тупе возможно при формировании более широкой манжетки до 3 см, а снижение частоты развития дисфагии при фундопликации по Ниссену при наложении более узкой до 2 см манжетки [11, 12, 13].

Мобилизация дна желудка с пересечением коротких сосудов, задняя круорофия и фиксация манжетки к пищеводу позволили снизить частоту соскальзывания манжетки с 13–15 % до 0 % [14].

Мобилизация абдоминального отдела пищевода, свободно наложенная манжетка и выполненная круорофия позволяют снизить неэффективность фундопликационной манжетки [15].

Развитие лапароскопических технологий позволило выполнять операции на пищеводно-желудочном переходе менее травматично, снизило сроки реабилитации и временной утраты трудоспособности пациентов. Однако, использование лапароскопических технологий в хирургии

пищеводно-желудочного перехода не решает проблему неудовлетворительных результатов хирургического лечения и развития рецидива заболевания. Основными вопросами антирефлюксной хирургии до сих пор является соотношение между типом создаваемой манжетки, степенью мобилизации дна желудка и абдоминального отдела пищевода и частотой развития послеоперационной дисфагии. Данная проблема достаточно актуальна и требует пристального внимания, детального анализа и поиска путей ее решения.

Цель работы: анализ результатов лапароскопической фундопликации у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы для улучшения отдаленных результатов лечения.

Материалы и методы. В основе исследования лежат результаты обследования и хирургического лечения 85 больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, которые находились на хирургическом лечении в ГУ “Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова” НАМН Украины за период с 2005 по 2015 год. Всем больным в плановом порядке была выполнена лапароскопическая коррекция замыкательной функции нижнего пищеводного сфинктера.

В алгоритм оценки морфофункционального состояния пищевода, пищеводно-желудочного перехода было включено эндоскопическое, рентгенологическое исследование, **pH-метрия** пищевода и желудка, манометрия пищевода.

При оценке состояния пищеводно-желудочного перехода обращали внимание на уровень расположения зубчатой линии, функциональное состояние нижнего пищеводного сфинктера и кардии, состояние слизистой оболочки пищевода (гиперемия, отек, наличие эрозий и язв). Особое внимание обращали на наличие и оценку очагов метаплазии слизистой оболочки пищевода (пищевод Барретта).

Женщин было 51 (60 %), мужчин – 34 (40 %). Чаще всего ГЭРБ встречалась в возрасте от 31 до 60 лет. Самой частой жалобой была изжога, которая отмечена у 47 (55,3 %) больных. У 10 (11,8 %) больных преобладали внепищеводные проявления. Средняя продолжительность заболевания составила (45,7±11,3) месяца.

Более чем у половины пациентов – 46 (54,1 %) диагностирована эндоскопически негативная форма ГЭРБ. В структуре рефлюкс-эзофагита чаще всего встречался рефлюкс-эзофагит LA-C у 38 (44,7 %)

больных, наиболее редко рефлюкс-эзофагит LA-D у 5 (5,9 %) пациентов. Пищевод Барретта встречался у 2 (2,4 %) больных, язва пищевода у 3 (3,5 %) пациентов, стриктура пищевода у 2 (2,4 %) больных. Обычно кардия находится на расстоянии 39–41 см от резцов у мужчин и 38–39 см у женщин.

По данным рентгенологического исследования, наиболее часто ГЭРБ ассоциировалась со смешанной ГПОД (СГПОД) – у 41 (48,2 %) больного, наиболее редко с параэзофагеальной ГПОД (ПГПОД) – у 1 (1,2 %) больного.

У 24 (28,2 %) больных диагностирован короткий пищевод – I степени, у 17 (20,0 %) – II степени.

У всех пациентов диагностирован патологический желудочно-пищеводный рефлюкс, и индекс DeMeester составил у них 45,69±5,2. Более чем у половины пациентов – 46 (54,1 %) зарегистрирован рефлюкс в ночное время. Следует отметить, что более чем у половины пациентов – 47 (55,3 %) базальное рН в желудке было в пределах нормы. Только у трети пациентов – 26 (30,6 %) регистрировалась гиперацидность желудка.

Для пациентов, у которых патологический рефлюкс регистрировался в дневное время, было характерно преобладание эндоскопически негативной ГЭРБ. У пациентов с ночным и “постоянным” рефлюксом при эндоскопическом исследовании диагностировались эрозивные изменения слизистой оболочки пищевода.

Манометрия пищевода была выполнена 60 (70,6 %) пациентам. У 5 (5,3 %) из них давление нижнего пищеводного сфинктера находилось в пределах нормы. У остальных пациентов давление нижнего пищеводного сфинктера было значительно снижено и в среднем составляло ((0,8–1,1) ± 0,1) кПа ((6,25–8,44) ± 0,97) мм рт. ст.

Основными техническими особенностями антирефлюксной операции были: низведение абдоминального отдела пищевода не менее 3 см в брюшную полость, формирование безнатяжной манжетки из дна желудка вокруг пищевода, использование для фиксации тканей нерассасывающийся шовный материал, выполнение крурорафии и фундопликации на толстом желудочном зонде 56–60 Fr. При полной фундопликации – мобилизация дна желудка с пересечением коротких сосудов желудка и формирование короткой манжетки до 2 см, при частичной фундопликации на 270° – манжетки не менее 3 см.

При оперативной коррекции антрирефлюксного механизма мы выполняли как полную, так и частичную фундопликацию. У 1 пациента была выполнена полная фундопликация в модификации Ниссен–Розетти, без пересечения желудочно-

селезеночной связки и мобилизации дна желудка. При частичной фундопликации выполняли заднюю фундопликацию по Тупе.

Задняя крурорафия выполнена у 76 (89,4 %) больных, у 6 (7,1 %) из них мы использовали тефлоновые протезы, у 3 (3,5 %) больных задняя крурорафия была дополнена передней. 1 (1,2 %) пациенту при хиатопластике на пищеводное отверстие диафрагмы был имплантирован синтетический протез. Полная лапароскопическая фундопликация по Флоппи–Ниссену была выполнена 70 (82,4 %) пациентам, фундопликация по Ниссену в модификации Розетти – 1 (1,2 %) пациенту. Частичная задняя фундопликация по Тупе выполнена 14 (16,5 %) пациентам.

Результаты исследований и их обсуждение. Средняя продолжительность операций составила (256,9±80,3) мин, средняя кровопотеря (147,8±44,9) мл.

В раннем послеоперационном периоде типичных жалоб, характерных для желудочно-пищеводного рефлюкса, ни у одного пациента обеих групп не было зарегистрировано. Явления дисфагии в раннем послеоперационном периоде мы наблюдали у 8 (9,4 %) пациентов, вздутие живота у 2 (2,4 %) больных, раннее насыщение после принятия пищи у 5 (5,9 %) больных. К моменту выписки из клиники все эти жалобы купировались самостоятельно.

У 2 (2,4 %) пациентов в начале освоения лапароскопической методики имело место кровотечение из коротких сосудов желудка и травматическое повреждение печени, у 3 (3,5 %) пациентов – левосторонний пневмоторакс, в связи с чем у 2 (2,4 %) из них потребовалась конверсия. Повреждение пищевода и осложнения гнойно-септического характера ни у одного пациента мы не наблюдали. Послеоперационный койко-день – (4,00±2,03) дня.

В течение первого года у 4 (4,7 %) пациентов наблюдались дисфагия, вздутие живота, интен-

сивность проявлений которых со временем уменьшилась. В течение первого полугодия эти жалобы имели место у 3 (3,5 %) больных. В сроки до 2 лет данных о рецидиве ГЭРБ ни у одного пациента мы ни клинически, ни инструментально не зарегистрировали.

Через 2 года рецидив ГЭРБ был зарегистрирован у 1 (1,2 %) больного. При ЭФГДС диагностирован пищевод Барретта на фоне возобновления типичной симптоматики.

Через 5 лет и более после оперативного вмешательства у 2 (2,4 %) больных диагностирован рецидив ГПОД с возобновлением симптоматики ГЭРБ. Больные вернулись к приему медикаментозной терапии по причине рецидива заболевания. Несмотря на рецидив ГЭРБ качество жизни этих пациентов было выше, чем до операции, и в целом пациенты были удовлетворены результатами лечения.

У всех больных рецидив ГПОД и ГЭРБ наблюдался у пациентов со смешанной ГПОД. Ни у одного пациента с использованием тефлоновых протезов рецидива заболевания мы не отмечали.

Выводы. Лапароскопические антирефлюксные оперативные вмешательства у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью позволяют получить хорошие и удовлетворительные результаты у 97 % больных. Лапароскопическая фундопликация является эффективным методом лечения больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и позволяет нормализовать индекс DeMeester, повысить давление НПС и нормализовать состояние слизистой пищеводно-желудочного перехода.

Перспективы дальнейших исследований. Разработка и модификация имеющихся вмешательств с целью улучшения результатов оперативного вмешательства являются перспективным направлением современной хирургии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Salminen P. T. P. Comparison of long-term outcome of laparoscopic and conventional nissen fundoplication: a prospective randomized study with an 11-year follow-up / P. T. P. Salminen, H. I. Hiekkanen // *Ann. Surg.* – 2007. – Vol. 246, № 2. – P. 201–216.
2. Sharp N. E. Single-site nissen fundoplication versus laparoscopic nissen fundoplication / N. E. Sharp, J. Vassaur, F. P. Buckley // *JLS.* – 2014. – Vol. 18.
3. 20 years later: laparoscopic fundoplication durability / B. Robinson, C. M. Dunst, M. A. Cassera [et al.] // *Surg. Endosc.* – 2014. Epub ahead of print.
4. Laparoscopic fundoplication: Nissen versus Toupet two-year outcome of a prospective randomized study of 200 patients regarding preoperative esophageal motility / U. Strate, A. Emmermann, C. Fibbe [et al.] // *Surg. Endosc.* – 2008. – Vol. 22, № 1. – P. 21–30.
5. Qu H. Short- and long-term results of laparoscopic versus open anti-reflux surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials / H. Qu, Y. Liu, Q. S. He // *J. Gastrointest. Surg.* – 2014. – Vol. 18, № 6. – P. 1077–1086. doi: 10.1007/s11605-014-2492-6. Epub 2014 Mar 14.
6. Gooszen Surgical Reintervention After Failed Antireflux

З ДОСВІДУ РОБОТИ

- Surgery: A Systematic Review of the Literature / E. J. B. Furnee, W. A. Draaisma, L. A. Breeders, G. Hein // *J. Gastrointest. Surg.* – 2009. – Vol. 13, 8. – P. 1539–1549.
7. Neuvonen P. Endoscopic evaluation of laparoscopic nissen fundoplication: 89 % success rate 10 years after surgery / P. Neuvonen, M. Iivonen, T. Rantanen // *World J. Surg.* – 2014. – Vol. 38, № 4. – P. 882–889. doi: 10.1007/s00268–013–2349–2.
8. A meta-analysis comparing laparoscopic partial versus Nissen fundoplication / S. Ma, B. Qian, L. Shang [et al.] // *ANZ J. Surg.* – 2012. – Vol. 82, № 1–2. – P. 17–22. doi: 10.1111/j.1445–2197.2010.05637.x. Epub 2011 Jan 20.
9. Randomized clinical trial of laparoscopic total (Nissen) versus posterior partial (Toupet) fundoplication for gastro-oesophageal reflux disease based on preoperative oesophageal manometry / M. I. Booth, J. Stratford, L. Jones, T. C. Dehn // *Br. J. Surg.* – 2008. – Vol. 95. – P. 57–63.
10. Hunter J. G. Dysphagia after laparoscopic antireflux surgery: the impact of operative technique / J. G. Hunter, L. Swanstrom, J. P. Waring // *Ann. Surg.* – 1996. – Vol. 224, № 1. – P. 51–57.
11. Proton pump inhibitor treatment of patients with gastroesophageal reflux-related chronic cough: a comparison between two different daily doses of lansoprazole / F. Baldi, R. Cappiello, C. Cavoli [et al.] // *World J. Gastroenterol.* – 2006. – Vol. 12. – P. 82–88.
12. Comparison of long-term outcome of laparoscopic and conventional nissen fundoplication: a prospective randomized study with an 11-year follow-up / P. T. Salminen, H. I. Hiekkänen, A. P. Rantala, J. T. Ovaska // *Ann. Surg.* – 2007. – Vol. 246, № 2. – P. 201–206.
13. Five-year subjective and objective results of laparoscopic and conventional Nissen fundoplication: a randomized trial / W. A. Draaisma, H. G. Rijnhart-de Jong, L. A. Breeders [et al.] // *Ann. Surg.* – 2006. – Vol. 244. – P. 34–41.
14. Failed antireflux surgery: quality of life and surgical outcome after laparoscopic fundoplication / F. A. Granderath, F. Kamolz, U. M. Schweiger [et al.] // *Int. J. Colorectal. Dis.* – 2003. – Vol. 18. – P. 248–253.
15. 139 A randomized, double-blind trial of the efficacy and safety of 10 or 20 mg rabeprazole compared with 20 mg omeprazole in the maintenance of gastro-oesophageal reflux disease over 5 years / B. Thjodleifsson, G. Rindi, R. Fiocca [et al.] and European Rabeprazole Study Group // *Aliment. Pharmacol. Ther.* – 2003. – Vol. 17, № 3. – P. 343–351.

Получено 21.10.15