

5. **Mazur E.S.**, 2009 «Dermatoglyphics in the prognosis of constitutional, physical and external identifying features of a person: dis. ... doctor Sciences: 14.00.24, 430 p. (in Russian).
6. **Abramova T.F.**, 2003, «Finger dermatoglyphics and physical abilities»: author's abstract. dis on the rack scientific degree doc. biol. Sciences: special 03.00.14 «Anthropology» / T. F. Abramova. - Moscow, 2003. - 51 p. (in Russian).
7. **Pyrozhhov D.V.**, E.S. Mazur 2009, «The Importance of Dermatoglyphics in Medical Criminology» ,No. 2, p.137 - 140. (in Russian).
8. **Leonov V.P.**, 2009, «Portrait and anthropometric reconstruction of man with methods of statistical dermatoglyphics» Computer science and control systems, N 4 (22), P. 33-36, (in Russian).
9. **Mukaka, M. M.** (2012). A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Medical Journal, 24(3), 69-71 (in English).

СУДОВО-МЕДИЧНІ КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕВІДОМОЇ ОСОБИ ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОТИПІЧНИХ ТА ДЕРМАТОГЛІФІЧНИХ ОЗНАК

Козань Н. М.

Резюме. У даній роботі представлено дані, отримані у ході вивчення взаємозв'язків антропометричних та дерматогліфічних параметрів дистальних фаланг пальців рук у осіб, що належать до гуцульської, бойківської та лемківської етно-територіальних груп, а також, запропоновано можливість використання отриманих даних з метою ідентифікації невідомої особи.

Ключові слова: судова медицина, ідентифікація особи, дерматогліфіка, антропометричні параметри.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕИЗВЕСТНОГО ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ И ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

Козань Н. М.

Резюме. В данной работе представлены данные, полученные в ходе изучения взаимосвязей антропометрических и дерматоглифических параметров дистальных фаланг пальцев рук у лиц, принадлежащих к гуцульской, бойковской и лемковской этно-территориальным группам, а также возможности использования полученных данных для идентификации неизвестного лица.

Ключевые слова: судебная медицина, идентификация личности, дерматоглифика, антропометрические параметры.

UDK 340.6+343

GENDER DIFFERENTIATION OF FACTOR CRITERIA OF DERMATOGLYPHIC PARAMETERS OF MIDDLE AND PROXIMAL PHALANGES OF THE FINGERS IN THE PERSON WHICH BELONGING TO THE LEMKO ETHNIC- TERRITIRIAL GROUPS

©Kotsyubnska Yu. Z.

Ivano- Frankivsk National Medical University

Resume. The proposed article presents data obtained in the study of gender differentiation the dermatoglyphics parameters of the middle and proximal phalanges of fingers of the hands of persons belonging to Lemko ethnoterritorial group. And also proposed the possibility of using the data obtained in order to predict the phenotypology of an unknown person.

Keywords. Dermatoglyphical parameters, ethnodermatoglyphics, criteria of Spirman.

The structure of papillary relief is highly informative, readily accessible for quantitative and qualitative study, is the subject of studying a range of medical and non-medical sciences.

The dermatoglyphical method is widely used in conducting research on ethno-related issues. One of the scientists who used the dermatoglyphical method in anthropological studies is Hight G. L. [1], who studied the dermatoglyphical parameters of the peoples of the Caucasus and Transcaucasia. Namely, in her work 1974-75rr. («Dermatoglyphics of

the peoples of Central Asia in connection with problems of their origin») highlighted the racogenic, ethnopopulative connections of the population of the Caucasus, Central Asia and the South of the European part of the USSR. [2]

A great contribution in this direction was made by Sidorenko AG [3]. He conducted a comprehensive study of dermatoglyphics of the palms, which allowed him to identify racial and sexual differences, depending on the quantitative and qualitative indicators, taking into account the topography of triadious and volary image, as well as the presence or absence of the main and additional triadious; has established a significant correlation in the manifestation of rare dermatological features between the palms of children and true parents.

Regarding the Ukrainian ethnodermatoglyphic, SV Segeda [4] made a significant contribution to its development, which studied the differentiation of the population of Ukraine by dermatoglyphical parameters. Based on the data obtained, he analyzed the variations of the main features of this system and identified local dermatoglyphical variants (complexes) on the territory of Ukraine (northern, central and southern). Using the data obtained during the study, he identified clear dermatoglyphical parameters that are characteristic of each of the complexes and made a comparison with ethno-territorial groups living in neighboring territories. This allowed him to highlight the general dermatoglyphical parameters of Ukrainians against the background of other ethnic groups living in Europe and Asia.

Unfortunately, at the present time almost unexplored correlations between the dermatoglyphical parameters of middle and proximal phalanges of the fingers [5] and anthropometric parameters.

The purpose of our study was to study the possibility of predicting the phenotypology of an unknown person, based on the use of dermatoglyphical parameters of middle and proximal phalanges of the fingers.

The object of the study was the correlation between dermatoglyphical and anthropometric parameters in the female (26) and male (25) gender groups living in the Ivano-Frankivsk region and belonging to the Lemko ethno-territorial group.

Methods of research used during the study are: anthropometric, dermatoglyphical and statistical analysis. Statistical analysis was conducted with the help of nonparametric method of Spirman (Spearman rank R) [6] and Multivariate Regression Analysis (Multiple Regression) [7]. Study was conducted with the help of statistical analysis stable correlations between dermatoglyphical parameters of middle and proximal phalanges of fingers and anthropometric parameters such as body length and shoulder width. During the analysis, a number of parameters having zero influence were established, that is, they are not found in the group of persons under study. In this regard, the above parameters were not taken into account.

An analysis of the results of a nonparametric study showed correlation between anthropometric and dermatoglyphical parameters of middle and proximal phalanges of fingers. For example, it is established that the length of the leg in the group under study correlates with such signs as: MF4LeftVm (-0,54), PF1LeftLu (-0,47), PF4LeftVm (-0,59), PF5RightS (-0,53), PF5RightLu (-0,54). Also, the length of the leg correlates with the height (0.88), which is the foreseeable result, and indirectly confirms the results of the analysis. It should be noted that the sign near the correlation coefficient shows the connection vector between the variables.

Taking into account the obtained values of Spirman correlation coefficients for a pair of signs (as an example, the length of the leg / PF4LeftVm), the value -0.59 can be interpreted as a sufficiently strong dependence [6]. That is, the results of the analysis show that when detecting the sign Vm on the proximal phalanx of the fourth finger of the left hand, the leg length will «decrease».

Data of the non-parametric analysis were refined with a more flexible and precise method, namely regression analysis (Table 1).

Processing the results obtained using this method only results with a high level of reliability were taken into account - the value of p (p-value) was within the range of $0.00 < p < 0.05$. The determination coefficient (coefficient of determination) of R^2 was within the limits $75 < R^2 < 100$ (that is, the constructed models describe at least 75% variability). Output data were checked for normal distribution of residues (residuals).

An estimation of the independence of the residues from the predicted values was also carried out [8]. The standardized study error does not exceed 10%.

In general, the regression equation has the form

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

For example, when searching for the predicted length of the leg in the group under study (Lemko, women) according to the signs of proximal phalanges, the regression equation (data given in Table 1) will take the form

$$Y = 94,33 - 15,18PF1LeftLu - 11,04PF4LeftVm - 11,25PF2LeftLu - 8,33PF2LeftAdr$$

To check this expression we will substitute the data from the control sample instead of signs 1 or 0 (1 - a case where the sign is observed in the subject, 0 - the sign is absent). It should also be taken into account that only one sign can be observed on a particular finger. As a result, for a control group with signs on the left hand we receive:

1) Hdr, Fu, Vm, Vm, Vu and leg length 86 cm:

$$Y = 94,33 - 15,18*0 - 11,04*1 - 11,25*0 - 8,33*0 = 83.29 \text{ (cm)}$$

2) Lu, ApNu, ApNr, Hdr, Lu and leg length 84 cm:

$$Y = 94,33 - 15,18*1 - 11,04*0 - 11,25*0 - 8,33*0 = 79.15 \text{ (cm)}$$

3) ApNr, Adr, ApNu, Hdr, ApNr Lu and leg length 86 cm:

$$Y = 94,33 - 15,18*0 - 11,04*0 - 11,25*0 - 8,33*1 = 86.0 \text{ (cm)}$$

Table 1

**Summary table of the results of multiple regression for women of the Lemko ethno-territorial group
(sign+ shows a positive correlation, a sign -is a negative correlation)**

Middle phalang		Proximal phalang	
Sign	Coefficient influence	Sign	Coefficient influence
Growth / b = 163,17		Growth / b = 164,11	
MF3LeftVm	-107,17	PF1LeftLu	-66,33
		PF3RightS	45,66
		PF2LeftLu	-29,22
		PF1LeftVr	-40,78
Body length / b = 55,70		Body length / b = 57,07	
MF3LeftVm	-18,70	PF3LeftApNu	-8,95
		RIGHT4W	-7,41
		PF2RightVr	10,88
Shoulder width / b = 37,94		Shoulder width / b = 37,55	
MF3LeftVm	-13,94	PF1LeftLu	-10,37
		PF3RightS	1,72
		PF1LeftVr	-6,18
Foot length / b = 24,29		Foot length / b = 24,31	
MF3LeftVm	-8,29	PF1RightS	-4,31
Palm length / b = 17,41		Palm length / b = 17,37	
MF3LeftVm	48,58	PF1RightS	24,62
Arm length / b = 88,82		Arm length / b = 94,33	
MF3LeftVm	-36,82	PF1LeftLu	-15,18
		PF4LeftVm	-11,04
		PF2LeftLu	-11,25
		PF2LeftAdr	-8,33

Thus, we see that the predicted result X of the length of the leg varies within $[4 + X - 4]$ cm, with an error estimate of <5%, which is a fairly good result.

As a result of the conducted researches groups of dermatoglyphic signs that correlate with anthropometric features are revealed. For the studied group of individuals there is a clear, mostly negative connection between the sign Vm in the middle phalanges and the anthropometric parameters. The main features of proximal phalanges that correlate with anthropometric parameters are Lu, Vr, Vm, Adr, ApNu S, Hdr.

Having conducted a similar study among men of the gender group, it was established, that for men of this group there is a stable correlation between the appearance of signs of ApNu and ApNr and such anthropometric parameters as height, body length and shoulder width which in turn correlate with each other - that is, there is a direct relationship between height and length of the body. Also, there are links between the features of Dhu in the middle phalanx and the length of the foot and palm. The appearance of the Adu sign on the proximal phalanges correlates with height, length of arm and shoulder width. Moderate correlation with anthropodatas is also observed in the signs Lr, Hdr, Adu, Dhu.

The obtained results of multiple regression for men of the Lemko ethno-territorial group are given in tab. 2.

Table 2

**Summary table of the results of multiple regression for men of the Lemko ethno-territorial group (the + sign
shows a positive correlation, the sign- is a negative correlation)**

Middle phalang		Proximal phalang	
Sign	Influence factor	Sign	Influence factor
Growth / b = 163,17		Growth / b = 171,40	
MF3LeftApNu	12,10	PF1LeftAdu	15,60
		PF3LeftApNu	14,10
		PF3RightApNr	7,60

		PF5LeftApNu	9,60
Body length / b = 58,70		Body length / b = 62,66	
MF3LeftApNu	15,30	PF3RightApNr	-10,16
		PF3LeftApNu	9,25
Shoulder width / b = 48,50		Shoulder width / b = 46,57	
MF4RightLr	4,50	PF1LeftAdu	6,28
		PF3RightApNu	-4,07
		PF4RightLr	-3,71
Foot length / b = 29,62		Foot length / b = 29,62	
MF2LeftDhu	-5,50	PF1LeftHdr	-5,50
Palm length / b = 20,37		Palm length / b = 20,20	
MF2LeftDhu	13,12	PF3RightApNr	27,30
Arm length / b = 69,94		Arm length / b = 81,83	
MF3LeftHdu	-9,90	PF2LeftAdu	-9,83

Having conducted a comparative analysis of the results obtained for female and male gender groups, it can be concluded that the ApNu sign correlates with anthropometric parameters in both gender groups. Also, in both groups, the high level of communication with the sign of Hdr.

In the discussed aspect, it is very important to study the correlation between dermatological and anthropometric parameters, as well as the possibility of their use as prognostic features in the study of the phenotypology of an unknown person. Because along with the basic identification methods, the resolution of the method of dermatoglyphics can become more effective and reliable in attracting additional system of attributes.

Thus, the successful use of dermatoglyphics to identify an unknown person, along with other methods, allows you to speak about a system of methods that effectively complement each other. In addition, insufficient development, practical necessity, simplicity, non-invasiveness and material non-severity of the method determine the choice of finger dermatoglyphics when searching for criteria for diagnosis and markers for the manifestation of the phenotype.

References:

1. **Khit G.L.**, Dolinova N.A. Race differentiation of humanity Dermatoglyphic data. M.: Nauka, 1990. - 206 p.
2. **Khit G.L.** Dermatoglyphics of the peoples of Central Asia in connection with problems of their origin / Abstracts of reports at the session. devoted to the results of field ethnographic and anthropological studies in 1974-1975. Dushanbe, 1976. - 46-47 p.
3. **Sidorenko A.G.** Possibilities of palm dermatoglyphics in forensic identification of an individual: author's abstract. diss to soup. scientific degree Candidate. Sciences: special 14.00.24 «Forensic Medicine» / A.G.Sydorenko. - Moscow, 2006. - 22 p.
4. **Segeda S.P.** Anthropological composition of the Ukrainian people: ethnogenetic aspect: author's abstract. dis for gaining sciences step doc. history Sciences: special 07.00.05 «Ethnology», 03.00.14 «Anthropology» / S.P. Segeda - Kyiv, 2002. - 28 p.
5. **Shpak L.Yu.** Dermatoglyphic phalanges of the fingers (anthropological and forensic medical aspects): author's abstract. diss to soup. scientific degree Candidate. Sciences: special 14.00.24 «Forensic Medicine» / L.Yu.Shpak - Moscow, 2003. - 25 p.
6. **Zar J. H.** (1998). Spearman rank correlation. Encyclopedia of Biostatistics.
7. **Bilodeau, M.**, & Brenner, D. Theory of multivariate statistics. Springer Science & Business Media. - 2008. - 123 p.
8. <http://www.statsoft.com/Textbook/General-Regression-Models>. - 2016. - 15 p.

ГЕНДЕРНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФАКТОРНИХ КРИТЕРІЇВ ДЕРМАТОГЛІФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СЕРЕДНІХ ТА ПРОКСИМАЛЬНИХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦІВ РУК У ОСІБ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ЛЕМКІВСЬКОЇ ЕТНО- ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРУПИ

Коцюбинська Ю. З.

Резюме. У запропонованій статті представлені дані, отримані у ході вивчення гендерної диференціації дерматогліфічних параметрів середніх та проксимальних фаланг пальців рук у осіб, що належать до лемківської етно-територіальної групи. А також, запропоновано можливість використання отриманих даних з метою прогнозування фенотипології невідомої особи.

Ключові слова: дерматогліфічні параметри, етнодерматогліфіка, критерій Спірмена.

ГЕНДЕРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФАКТОРНЫХ КРИТЕРИЕВ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДНИХ И ПРОКСИМАЛЬНЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ РУК У ЛИЦ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ЛЕМКОВСКОЙ ЭТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРУППЕ

Коцюбинская Ю. З.

Резюме. В предлагаемой статье представлены данные, полученные в ходе изучения гендерной дифференциации дерматоглифических параметров средних и проксимальных фаланг пальцев рук у лиц, принадлежащих к лемковской этно-территориальной группы. А также, представленная возможность использования полученных данных для прогнозирования фенотипологии неизвестного лица.

Ключевые слова: дерматоглифические параметры, этнодерматоглифика, критерий Спирмена.

УДК 340.6:61:02-12/1057-3

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ В УМОВАХ МАСОВОЇ ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ

©Моргун А.О.¹, Хижняк В.В.², Моргун О.О.¹, Малихіна О.І.¹, Войтов Є.О.¹, Пасюга О.І.¹

¹КЗ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи»

²Харківський національний медичний університет

Резюме. У статті запропоновано авторський погляд на шляхи оптимізації роботи судово-медичних експертів в умовах масової загибелі людей та ідентифікацію як основний спосіб моделювання механізму події й визначення часу обставин, що склалися при виникненні масових жертв (природні катаклізми, масові аварії, катастрофи, отруєння, протестні та бойові дії). Показано важливу роль сортування на основних етапах огляду масових жертв і проведення судово-медичних експертиз.

Ключові слова: масові жертви, ідентифікація, сортування, судова медицина, оптимізація, моделювання.

Вступ. Комплексний підхід для проведення ідентифікації осіб під час масових жертв будь-якого генезу (природні катаклізми, масові отруєння, аварії, протестні дії, техногенні катастрофи, бойові дії, епідемії, епізоотії тощо) не викликає сумнівів і нещодавно ствердився у сучасній вітчизняній і світовій практиці судової медицини [3, 5].

Основні засади першого досвіду роботи судових медиків в умовах масової загибелі людей було сформовано в зв'язку з початком проведення антитерористичної операції (далі – АТО) в Україні у 2014 р. Так, А.В. Кісь і В.Д. Мішалов та співавтори (2014) провели аналіз ефективності використання наявних можливостей обласних бюро судово-медичної експертизи України щодо бойових втрат в АТО на прилеглих територіях Сходу України [1, с. 4]. Автори визначили, що для здійснення заходів ідентифікації та паралельного проведення судово-медичної експертизи під час огляду великого обсягу біологічних об'єктів склад судово-медичної бригади може мати 6 судово-медичних експертів, 7 лаборантів, 1 медичного реєстратора, 3-4 санітара. До зазначених заходів може бути залучений персонал, що не має відповідної підготовки, а саме – волонтери, військові службовці та ін. На всіх етапах виконання роботи та її організаційно-методичний контроль належить досвідченим співробітникам відділу судово-медичної експертизи трупів обласних бюро судово-медичної експертизи. Крім того, авторами запропоновано використання конвеєрно-послідовного підходу до огляду великої кількості жертв бойових дій, що скорочує