

©М. І. Швед, Н. М. Ковбаса, Л. В. Садлій, Н. М. Вівчар, О. А. Прокопович
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК РОЗВИТКУ ІНФАРКТУ (НЕКРОЗУ) МІОКАРДА 2 ТИПУ, ІНДУКОВАНОГО ПРИЙОМОМ АНАБОЛІЧНИХ СТЕРОЇДІВ ТА БЕТА-АДРЕНОСТИМУЛЯТОРІВ

Резюме. Факторами ризику та тригерами інфаркту міокарда (ІМ) у молодих людей можуть бути не традиційні серцево-судинні, а й інші причини, такі, як коронаропазм, зловживання наркотичними та іншими токсичними засобами (екзогенні глюокортикоїди, анаболічні стероїди, β -адреностимулатори тощо), що пов'язано з активною рекламию бодібілдингу та препаратів, які сприяють нарощуванню м'язової маси і спалюванню жиру.

Мета дослідження – підвищити увагу та мотивацію лікарів до своєчасної діагностики та адекватного лікування інфаркту (некрозу) міокарда 2 типу на тлі прийому високих доз анаболічних стероїдів та β -адреностимулаторів.

Матеріали і методи. Проаналізовано клінічний випадок пацієнта з інфарктом міокарда на тлі прийому анаболічних стероїдів та β_2 -агоністів.

Результати дослідження та їх обговорення. Особливістю клінічних проявів, діагностики та лікування такого інфаркту (некрозу) міокарда 2 типу є наявність не лише інфарктоподібних електрокардіографічних змін, а й те, що початок хвороби проявляється нетиповим, "стерпітим" ангінозним синдромом на тлі гіпердинамічного синдрому (вираженої тахікардії та підвищеного систолічного артеріального тиску) й ознак гіперсимпатикотонії. Диференційно-діагностичними критеріями в таких випадках можуть бути інфарктоподібна елевація сегмента ST, але без реципрокності змін, відсутність локальних зон гіпо- та акінезів за даними ЕхоКГ, а також детальне з'ясування факторів ризику та можливих тригерів некротичних змін в міокарді. "Золотим стандартом" для диференційної діагностики в таких випадках вважають контрастну коронароангіовентрикулографію.

Висновки. Неконтрольований прийом пацієнтами молодого віку анаболічних стероїдів та β -адреностимуллювальних засобів суттєво підвищує у них серцево-судинний ризик та може бути тригером розвитку зон некрозів міокарда (ІМ 2 типу). Лікування інфаркту міокарда унаслідок передозування β_2 -агоністів (зокрема кленбутиrolу) повинно включати прийом β -адреноблокаторів в адекватних дозах, а також дезінтоксикаційну та антигістамінну терапію, що дозволяють досягти швидкого клінічного ефекту і попередити розвиток життєво небезпечних ускладнень.

Ключові слова: інфаркт міокарда 2 типу; діагностика; лікування; β -адреностимулатори; анаболічні стероїди.

ВСТУП У більшості випадків інфаркту міокарда (ІМ) у молодих людей традиційні серцево-судинні фактори ризику продовжують мати надзвичайно важливе значення, але в цьому віці також необхідно враховувати й інші причини, такі, як коронаропазм, зловживання наркотичними та іншими токсичними засобами (екзогенні глюокортикоїди, анаболічні стероїди, β -адреностимулатори тощо). На сьогодні активна реклама бодібілдингу та препаратів, що сприяють нарощуванню м'язової маси, призводять до їх широкого застосування не тільки серед професійних спортсменів, а й серед молодих чоловіків [1–3]. Анаболічні препарати (*anabolic* – від грец. *anabole* – підйом) – лікарські препарати, які посилюють біосинтез білків та стимулюють процеси регенерації та поділяються на стероїдні ("Метандіенон", "Станазолол") і нестероїдні ("Інозин", "Оротова кислота").

Анаболічні стероїди є синтетичними похідними тестостерону ("Метандіенон", "Станазолол") і їх часто нелегально використовують спортсмени для підвищення їх фізичної працездатності. Існує кореляція між застосуванням цих препаратів та підвищеннем серцево-судинного ризику внаслідок розвитку концептричної гіпертрофії та діастолічної дисфункції лівого шлуночка, дисфункції ендотелію, прямого токсичного впливу на кардіоміоцити, дисліпідемії, гіперкоагуляції (зниження рівня простатиціліну, простагландинів та підвищення рівня тромбоксану A_2 , підвищення гематокриту) та катехоламінергічного стресу з наступним виникненням вазоспазму або розвитком тромбу [2, 4, 5, 10]. Тому більшість дослідників вважає, що саме через вищеописані ефекти при тривалому прийомі високих доз анаболічних стероїдів можливий розвиток неішемічних (токсичних, метаболічних) некрозів у міокарді та/або ішемічних некрозів (інфаркту міокарда) унаслідок тромбозу коронарної артерії, що підтверджено в ряді випадків коронароангіографією [2, 3, 5, 6].

Значно менше в спеціальній літературі висвітлено проблему токсичного впливу на міокард β -адреностимулаторів, так як ці препарати в більшості випадків використовують при невідкладних клінічних станах і при ретельному лікарському контролі. Враховуючи той факт, що β -адреностимулатори суттєво підвищують інтенсивність обмінних процесів в організмі, в т. ч. із використанням ненасичених жирних кислот, то окрім препаратів з групи β -стимулаторів ("Кленбутерол") все частіше застосовують для швидкого зменшення маси тіла в якості спалювачів жиру. Кленбутерол є потужним β_2 -агоністом, який використовують для лікування захворювань дихальних шляхів у ветеринарній практиці, але також має виражений анаболічний та ліполітичний ефекти, що дозволило рекомендувати даний засіб для схуднення. Проте в даний час мало відомо про його потенційний серцево-судинний ризик та про можливі кардіальні ускладнення. У спеціальній літературі є повідомлення про три випадки ІМ, в яких кленбутерол, можливо, мав ключову тригерну роль. Припускають, що його позитивні хронотропні та інотропні ефекти, крім перерозподілу коронарного кровобігу, можуть спричиняти ішемію міокарда [6–9].

У літературі, доступній нам, ми не знайшли повідомлень про можливі клінічно значимі негативні кардіальні ефекти при одночасному прийомі β -адреностимулаторів та анаболічних стероїдів, що спонукало провести власне клінічне спостереження.

Метою дослідження було підвищити увагу та мотивацію лікарів до своєчасної діагностики та адекватного лікування інфаркту (некрозу) міокарда 2 типу на тлі прийому високих доз анаболічних стероїдів та β -адреностимулаторів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ Системний аналіз, бібліосемантика та аналіз випадку захворювання конкретного пацієнта з некрозом міокарда після прийому анаболічних

стероїдів та бета-адреностимуляторів. Пошук джерел здійснювали за допомогою науково-статистичної бази даних медичної інформації: PubMed-NCBI.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Опис клінічного випадку. 14.11.2018 р. у палату інтенсивної терапії кардіологічного відділення Тернопільської університетської лікарні (ТУЛ) госпіталізовано пацієнта П., 31 рік, зі скаргами на відчуття серцебиття, тремор кінцівок, виражену загальну слабість, пітливість. На момент огляду були відсутні напади нестачі повітря та біль за грудиною. З анамнезу з'ясовано, що протягом останніх 15 років періодично відмічає підвищення артеріального тиску (АТ) до 170–95 мм рт. ст. Спадковий анамнез обтяжений – мати хворіє на гіпертонічну хворобу, батько переніс інфаркт міокарда в 54 роки. Протягом останніх 5-ти років пацієнт несистематично, але в достатньо високих дозах (по 2 таблетки тричі на добу) приймав пероральні препарати анаболічних стероїдів ("Метандіенон", "Станазолол") та відвідував спортивний зал для занять бодібілдингом. Курить (блíзько 2 пачок цигарок на добу), надмірно вживає каву (3–5 чашок щоденно).

13.11.2018 р. ввечері хворий прийняв 4 таблетки селективного агоніста β_2 -адренорецепторів – "Кленбутирол". Через одну годину відчув тисучий біль за грудиною, посилене серцебиття, тремор усього тіла на тлі підвищеного АТ до 180–100 мм рт. ст. Боловий синдром рецидивував о 4⁰⁰, у зв'язку з чим пацієнт викликав бригаду екстреної медичної допомоги та його госпіталізували у районну лікарню за місцем проживання з підозрою на гострий коронарний синдром, так як на контрольній електрокардіограмі (ЕКГ) зафіксовано елевацію сегмента ST. Для подальшого лікування та дообстеження пацієнта направили в ТУЛ.

При госпіталізації пацієнт емоційно лабільний. Шкірні покриви бліді, вологі, теплі на дотик, акроціаноз. На шкірі обличчя акне. Температура тіла від 36,6 °C. Пульс – 112 уд. на хв, ритмічний. На кардіомоніторі синусовий ритм. Артеріальний тиск – 160–90 мм рт. ст. Аускультивно діяльність серця ритмічна, тони ослаблені, акцент II тону над аортою. Дихання самостійне, адекватне.

Частота дихання – 20 уд. на хв, сатурація кисню за даними пульсоксиметрії – 94 %. Над легенями вислуховується жорстке дихання, сухі хріпи в нижніх відділах легень. Язык вологий. Живіт симетричний, м'який, збільшений у розмірах за рахунок підшкірної жирової клітковини. Нижній край печінки пальпується на 4 см нижче реберної дуги. Наявні стриї у ділянці сідниць та стегон. Болючість у костовертебральних синусах відсутня. Набряки не визначаються.

Електрокардіограму (ЕКГ) при госпіталізації представлено на рисунку 1. Діагностовано синусову тахікардію з частотою серцевих скорочень близько 109 уд. на хв, QS в II, патологічний зубець Q та елевація сегмента ST в II, III, aVF, V4- V6, aVL-Неб відведеннях. Звертає увагу на збереження вираженого зубця S у грудних відведеннях, в яких зафіксовано елевацію сегмента ST, а також на відсутність реципрокності даних змін.

За результатами біохімічного аналізу крові було відмічено значне підвищення рівня МВ-фракції креатинфосфокінази (МВ-КФК) – 244,0 Од/л (норма <25,0 Од/л) та тропоніну T – 1952,0 пг/мл (норма <14,0 Од/л), аспартатамінотрансферази (АсАТ) – 168,0 Од/л (норма <40,0 Од/л) та незначне підвищення мозкового натрійуретичного пропептиду – 260,8 пг/мл (норма <125,0 пг/мл). Інших відхилень у лабораторних показниках не виявлено.

За даними ехокардіоскопії (ЕхоКС) 14.11.2018 р. – аорта – 3,2 см, аортальний, мітральний та трикуспіdalний клапани без структурно-функціональних змін; КДРлш – 5,2 см, товщина стінки – 0,9 см у нормокінезі; ФВ = 65 %; правий шлуночок – 2,0 см, середній тиск у легеневій артерії – 20 мм рт. ст.

Враховуючи вищеописані клінічні та лабораторно-інструментальні дані, пацієнту поставлено діагноз гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST та призначено подвійну антитромбоцитарну терапію ("Кардіомагніл", "Тикагрелор"), "Клексан" по 0,8 мл двічі на добу, статини ("Розувастатин" у дозі 40 мг на добу), "Еplerenone" ("Інспра") по 25 мг/добу, антиангінальну ("Метопролол" у дозі 100 мг на добу) та гіпотензивну терапію ("Лізинопріл" в дозі 20 мг на добу). Протягом



Рис. 1. Електрокардіограма пацієнта П. (14.11.2018 р.).

перших двох діб проводили інфузійну терапію реосорбілактом (по 400 мл/добу та тиворелем по 100 мл/добу).

Кількість балів за шкалою GRACE – 78 балів (2 %), що відповідає категорії середнього ризику розвитку госпітальних ускладнень та смерті.

Проведено ургентну коронарографію, на якій не виявлено клінічно значимого ураження коронарних артерій (рис. 2).

Через 3 доби лікування загальний клінічний стан пацієнта суттєво покращився, нормалізувались показники гемодинаміки – АТ = 125–80 мм рт. ст., ЧСС = 82–86 на хв, зникли пітливість і тремор кінцівок, нормалізувались сон та апетит.

За даними ЕКГ від 19.11.2018 р., з'явилася помірна позитивна динаміка (рис. 3), перехід інфарктоподібних змін у підостру стадію. В грудних відведених зберігалась елевація сегмента ST в V4–V6 та aVL-Неб відведеннях

при збереженні в них глибокого зубця S. Зберігається також конкордантність ЕКГ-змін.

В аналізах сироватки крові, виконаних у динаміці, відмічено збільшення рівня тропоніну T, AcAT та фібриногену (за 15.11.2018 р. – тропоніновий тест – 2770,0 пг/мл; AcAT – 230,6 Од/л; фібриноген – 6,3 г/л).

16.11.2018 р. пацієнту повторно провели контрольну ЕхоКС: структурно-функціональні параметри серця ідентичні даним від 14.11.2018 р., але відмічено зниження ФВ до 52 % і виявлено сепарацію та потовщення листків перикарда. Analogічні зміни ЕхоКГ зареєстровані й 26.11.2018 р.

Динамічне спостереження за особливостями клінічного перебігу патологічного процесу та враховуючи наявність нетипових клінічних і лабораторних проявів хвороби (інфаркту міокарда як ішемічного некрозу), а також відсутність клінічно значимого стенозуючого коронарно-




Рис. 2. Результати коронаровентрикулографії пацієнта П. (14.11.2018 р.).




Рис. 3. Електрокардіограмма пацієнта П. (19.11.2018 р.).

го атеросклерозу та характерної для ІМ динаміки ЕКГ-проявів при наявності ЕхоКГ-змін, характерних для міокардиту та перикардиту, дало підстави встановити наступний клінічний діагноз: інфаркту міокарда 2 типу. Токсичні медикаментозні (вплив екзогенного тестостерону та β-агоніста "Кленбутиrol") некрози міокарда задньобокової ділянки лівого шлуночка (14.11.2018 р.), епістенокардитичний перикардит. Стійка синусна тахікардія. Гостра серцева недостатність II за Killip. СН II А ст. III ФК.

Після додатково проведеної дезінтоксикаційної та антигістамінної терапії протягом 10 днів стан хворого суттєво поліпшився, гемодинаміка стабільна, клінічних та ЕхоКГ-ознак серцевої недостатності немає, параметри лабораторних біомаркерів некрозу міокарда нормалізувались.

Таким чином, при наявності інфарктоподібних електрокардіографічних змін у пацієнтів молодого віку, в яких початок хвороби проявляється нетиповим, "стерпітим" ангінозним синдромом на фоні гіпердинамічного синдрому (вираженої тахікардії та підвищеного систолічного артеріального тиску) їх ознака гіперсимпатикотонії, необхідно проводити детальну диференційну діагностику з можливими неішемічними некрозами міокарда. Диференційно-діагностичними критеріями в таких випадках можуть бути лише інфарктоподібна елевація сегмента ST, але без реципрокності змін, відсутність локальних зон гіпо- та акінезів за даними ЕхоКГ, а також детальне з'ясування факторів ризику та можливих тригерів некротичних змін у міокарді. "Золотим стандартом" для диференційної

діагностики в таких випадках вважають контрастну коронароангіо-вентрикулографію. Як свідчать дані літератури та наведений клінічний випадок, однією з причин зон некрозу в міокарді може бути неконтрольований прийом екзогенних тестостеронів, анаболічних стероїдів та β-адреноміметиків. Рання діагностика та своєчасне призначення адекватної терапії (дезінтоксикаційної, антигістамінної, β-адреноблокуючої тощо) дозволяють досягти швидкого клінічного ефекту і попередити розвиток таких життєво небезпечних ускладнень як аритмій, різних типів гострої та хронікої серцевої недостатності, прогресування основного патологічного процесу.

ВИСНОВКИ 1. Неконтрольований прийом пацієнтами молодовіку анаболічних стероїдів та β-адреностимулюючих засобів суттєво підвищує у них ризик серцево-судинних захворювань, що можуть бути тригером розвитку зон некрозів міокарда (інфаркту міокарда 2 типу).

2. Одночасний прийом анаболічних стероїдів та β₂-агоністів ("Метандіенон", "Станазолол", "Кленбутиrol") мають синергічний ефект та сприяють розвитку зон ішемії та некрозу міокарда.

3. Клінічний перебіг, діагностика та лікування такого патологічного процесу має свої особливості, що необхідно враховувати в клінічній практиці.

4. Лікування інфаркту міокарда унаслідок передозування β₂-агоністів (зокрема кленбутиrolу) повинно включати прийом β-адреноблокаторів в адекватних дозах ("Метопролол" – 100 мг на добу), а також дезінтоксикаційну та антигістамінну терапії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Bodybuilding, exogenous testosterone use and myocardial infarction / R. W. Major, M. Pierides, I. B. Squire, E. Roberts // Q. J. Med. – 2015. – Vol. 108. – P. 651–652. doi:10.1093/qjmed/hcu173.
2. Santos R. P. Anabolic drugs and myocardial infarction – a clinical case report / R. P. Santos, A. Pereira, H. Guedes // Arq. Bras. Cardiol. – 2015. – Vol. 105 (3). – P. 316–319. DOI: 10.5935/abc.20150111
3. Kassem H. H. Anabolic steroids and testosterone abuse; a possible cause of myocardial infarction in young age / H. H. Kassem, R. Dashti, M. Al. Jarallah // Exp. Clin. Cardiol. – 2014. – Vol. 20, Issue 8. – P. 2685–2687.
4. Інфаркт міокарда в молодого чоловіка під час уживання анаболічного гормону метандіенону / Л. В. Ющик, О. Г. Яворський, А. Б. Гайдук [та ін.]. Медицина транспорту України. – 2011. – № 3. – С. 73–78.
5. Payne J. R. Cardiac effects of anabolic steroids / J. R. Payne, P. J. Kotwinski, H. E. Montgomery // Heart. – 2004. – Vol. 90. – P. 473–475. doi: 10.1136/hrt.2003.025783
6. Kierzkowska B. Myocardial infarction in a 17-year-old body builder using clenbuterol / B. Kierzkowska, J. Stańczyk, J. D. Kasprzak // Circ. J. – 2005. – Vol. 69 (9). – P. 1144–1146.
7. Clenbuterol and anabolic steroids: a previously unreported cause of myocardial infarction with normal coronary arteriograms / D. R. Goldstein, T. Dobbs, B. Krull, V. J. Plumb // South Med. J. – 1998. – Vol. 9 (8). – P. 780–784.
8. Barry A. R. Case report and review of clenbuterol cardiac toxicity / A. R. Barry, M. M. Graham // Journal of Cardiology Cases. – 2013. – Vol. 8. – P. 131–133.
9. Clenbuterol. Lexi-Comp, Inc (Lexi-ToxTM, version 1.11.0). Hudson, OH: Lexi-Comp, Inc., 2013.
10. Anabolic steroids, acute myocardial infarction and polycythemia: A case report and review of the literature / K. Stergiopoulos, J. J. Brennan, R. Mathews [et al.] // Vascular Health and Risk Management. – 2008. – Vol. 4 (6). – P. 1475–1480.

Отримано 03.09.18

Електронна адреса для листування: shved@tdmu.edu.ua

©M. I. Shved, N. M. Kovbasa, L. V. Sadliy, N. M. Vivchar, O. A. Prokopovych
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

CLINICAL CASE OF DEVELOPMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION (NECROSIS), TYPE 2, INDUCED BY USING OF ANABOLIC STEROIDS AND BETA-ADRENERGIC STIMULATORS

Summary. Risk factors and triggers of myocardial infarction in young people may be non-traditional cardiovascular, but also other causes such as spasm of coronary artery, drug abuse and other toxic substances (exogenous glucocorticoids, anabolic steroids, beta-adrenergic stimulators, etc.) associated with active promotion of bodybuilding and drugs that promote muscle build-up and fat burning.

The aim of the study – to increase the attention and motivation of doctors to timely diagnosis and adequate treatment of myocardial infarction (necrosis) in the context of receiving of high doses of anabolic steroids and beta-adrenergic stimulators.

Materials and Methods. The clinical case of the patient with myocardial infarction against the background of the use of anabolic steroids and β_2 -agonists is analysed.

Results and Discussion. The peculiarity of clinical manifestations, diagnosis and treatment of this type of myocardial infarction (necrosis) is not only the presence of infarction-like electrocardiographic changes, but the onset of the disease is manifested by the atypical, "erased" syndrome of angina on the background of hyperdynamic syndrome (severe tachycardia and increased systolic blood pressure) and signs of activation of the sympathetic nervous system. Differential diagnostic criteria in such cases may be infarction-like elevation of the ST segment, but without reciprocal changes, absence of local zones of hypo- and akinesis according to the data of the echocardiogram, as well as a detailed explanation of the risk factors and possible triggers of necrotic changes in the myocardium. A "golden standard" for differential diagnosis in such cases is considered as contrast coronary angioventriculography.

Conclusions. Uncontrolled use by young patients of anabolic steroids and beta-adrenostimulaion agents significantly increases their cardiovascular risk and may be a trigger for the development of zones of myocardial necrosis (type 2 MI). Treatment of myocardial infarction owing to overdose of β_2 -agonists (in particular clenbuterol) should include the intake of β -adrenoblockers in adequate doses, as well as detoxification and antihistamines therapy, which allow achieving a rapid clinical effect and prevent the development of life-threatening complications.

Key words: myocardial infarction type 2; diagnosis, treatment; beta-adrenergic stimulators; anabolic steroids.

©Н. И. Швед, Н. М. Ковбаса, Л. В. Садлій, Н. М. Вивчар, Е. А. Прокопович

ГВУЗ "Тернопольський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"

**КЛІНІЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА (НЕКРОЗА) МИОКАРДА 2 ТИПА, ИНДУЦИРУЕМОГО ПРИЕМОМ
АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ И БЕТА-АДРЕНОСТИМУЛЯТОРОВ**

Резюме. Факторами риска и триггерами инфаркта миокарда (ИМ) у молодых людей могут быть не традиционные сердечно-сосудистые, но и другие причины, такие, как коронароспазм, злоупотребление наркотическими и другими токсичными средствами (экзогенные глюкокортикоиды, анаболические стероиды, β -адреностимуляторы и тому подобное), что связано с активной рекламой бодибилдинга и препаратов, которые способствуют наращиванию мышечной массы и сжиганию жира.

Цель исследования – повысить внимание и мотивацию врачей к своевременной диагностике и адекватному лечению инфаркта (некроза) миокарда на фоне приема высоких доз анаболических стероидов и β -адреностимуляторов.

Материалы и методы. Проанализирован клинический случай пациента с инфарктом миокарда на фоне приема анаболических стероидов и β_2 -агонистов.

Результаты исследований и их обсуждение. Особенностью клинических проявлений, диагностики и лечения такого инфаркта (некроза) миокарда 2 типа есть наличие не только инфарктоподобных электрокардиографических изменений, но и то, что начало болезни проявляется нетипичным, "стертым" ангинозным синдромом на фоне гипердинамического синдрома (выраженной тахикардии и повышенного систолического артериального давления) и признаков гиперсимпатикотонии. Дифференциально-диагностическими критериями в таких случаях могут быть инфарктоподобная элевация сегмента ST, но без реципрокности изменений, отсутствие локальных зон гипо- и акинезии по данным ЭхоКГ, а также наличие факторов риска и возможных триггеров некротических изменений в миокарде. "Золотым стандартом" для дифференциальной диагностики в таких случаях считают контрастную коронароангиовентрикулографию.

Выводы. Неконтролируемое употребление пациентами молодого возраста анаболических стероидов и β -адреноблокаторов существенно повышает у них сердечно-сосудистый риск и может быть триггером развития зон некрозов миокарда (ИМ 2 типа). Лечение инфаркта миокарда вследствие передозировки β_2 -агонистов (в частности кленбутиrola) должно включать прием β -адреноблокаторов в адекватных дозах, а также дезинтоксикационную и антигистаминную терапии, что позволяют достичь быстрого клинического эффекта и предупредить развитие жизненно опасных осложнений.

Ключевые слова: инфаркт миокарда 2 типа; диагностика; лечение; β -адреностимуляторы; анаболические стероиды.