



ЗАМЕТКА

Новые находки некоторых видов совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины [New Findings of Some Noctuidae (Lepidoptera, Noctuidae) in Ukraine]. — Впервые в Донецкой обл. зарегистрированы *Euxoa christophi* Staudinger (19.07.2007, с. Брусовка Краснолиманского р-на, собр. Сова, опр. Матов), *Mesogona oxalina* Hufnagel (4 экз., 9–10.09.2009, с. Брусовка, собр. Сова, опр. Ключко), *Lithophane semibrunnea* Haworth, 1809 (5.05.2009, Брусовка), *L. socia* Hufnagel, 1766 (Донецк, ботсад, 4.08.2006), самец *Leucania zaea* Duponchel, 1827 (Донецк, 15.08.2006, собр. Сова, опр. Матов). Последний вид впервые обнаружен в лесобережной степи, до сих пор был известен из Крыма, Одессы, Черноморского заповедника и черноморского побережья Румынии. В Донецком ботаническом саду впервые поймана самка транспалеарктического вида *Chersotis cuprea* Denis et Schiffertmüller, 1775 13.09.2006 (размах крыльев 29 мм, собр. Сова, опр. Ключко), четвертая находка в Украине. Гусеница — полифаг на травянистых растениях, бабочки летают с конца июня до сентября, самки откладывают яйца в отмершие цветочные корзинки бояка и других астровых (Ключко и др., 2001). В Украине до сих пор была известна одна находка совки-металловидки *Diachrysia nadeja* Oberthür в с. Вакаловщина Сумского р-на (1.08.2002, Говорун) и пос. Старобешево (Ключко, 2003, 2008). Две бабочки этого вида пойманы в г. Донецке 15.08.2006 (размах крыльев 28 и 31 мм, собр. Сова). Также в Донецке обнаружены бабочки *Dysgonia algira* Linnaeus, 1767 (размах крыльев 38 мм, 27.06.2007, собр. Сова), *Noctua janthina* Denis et Schiffertmüller, 1775 — обе — вторые находки в Донецкой обл., в Ботсаду — *Hecatera capra* Hübner, 1809 (размах крыльев 32 мм, 7.07.2009, собр. Губин). В с. Кремневка близ заповедника «Каменные могилы» В. В. Мартынов зарегулировал 18.07.2009 (размах крыльев 26,5 мм) редкий вид *Acontia melanura* Tauscher, 1809 (ранее ошибочно определяли как *A. titania* Esper, 1798) ошибку обнаружил Г. Хакер (Hacker, 1996). По сообщению А. Ю. Матова, в коллекции ЗИН РАН (Санкт-Петербург, Россия) имеются бабочки этого вида из Ростовской обл. (Таганрога и др. пунктов), Саратовской, Пензенской, Чкаловской и Волгоградской областей, горы Машук), а также из Украины (с. Баурчи Измаильского уезда — ныне Одесской обл., окр. Луганска, с. Попасное Днепропетровской обл.), из Узбекистана (Buchara, Babatag mont.). В Украине вид, кроме того, отмечен и в других пунктах Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской областей, но везде локально и редко (Образцов, 1936, 1941; Ключко, 1978; Ключко и др., 2001; Ключко, 2006; Полтавский и др., 2010). Восточносредиземноморский степной вид, бабочки летают с конца мая по август, чаще в степных заповедниках, например: Стрельцовской и Провальской степи, «Каменных могилах». Ареал вида простирается от Балкан на юго-западе до Центральной Азии на юго-востоке, лёт бабочек с конца мая по август. В мае 2009–2010 гг. в Брусовке часто отмечена *Egira anatolica* M. Hering, 1933 восточносредиземноморский ксерофил, гусеницы питаются на держи-дереве *Paliurus*. В с. Брусовка обнаружены самка *Euxoa erita* Hübner, 1817 (7.07.2006), 2 экз. *E. nigrofusca* Esper, 1788 (28.06.2008, 19.07.2007, собр. Сова, опр. Ключко, Матов). Всего в Донецкой обл. ныне зарегистрированы 406, в урбанизированной зоне Донецка — 107 видов совок (Ключко, 2008). — **З. Ф. Ключко** (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины), **А. Ю. Матов** (ЗИН РАН, Санкт-Петербург, Россия), **Ю. Ф. Сова** (Донецкий ботанический сад НАН Украины).