

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНЬЮНКТИВИТА

А. М. Петруня, О. В. Селиванова, Г. В. Степаненко, В. Ф. Явтушенко

ГЗ «Луганский государственный медицинский университет», Кафедра офтальмологии и оториноларингологии (зав. каф. – доктор мед. наук, проф. А. М. Петруня), г. Луганск, Украина

Результаты комплексного лечения 38 пациентов с бактериальным конъюнктивитом, позволили установить, что комплексная программа лечения, включающая совершенствование оценки тяжести воспалительного процесса, разработка объективных критериев применения лечения в комплексной терапии препаратом «Факовит» (18 больных) позволило снизить время купирования признаков воспалительной реакции, снижение сроков нетрудоспособности.

Ключевые слова: бактериальный конъюнктивит, медикаментозное лечение, флоксал, факовит.

Вступление. Воспалительные заболевания глаз являются наиболее распространенной патологией, с которой встречаются в своей практической деятельности офтальмологи и являющиеся важной социальной проблемой как причина временной нетрудоспособности (80 %) и слепоты (10–12 %) [1, 2, 3, 5]. При всем многообразии проблема лечения конъюнктивита бактериальной этиологии привлекает большое внимание офтальмологов в связи с неуклонным ростом частоты данной патологии [4].

Цель работы: оценка эффективности серосодержащего препарата «Факовит» и анализ результатов комплексного лечения острого бактериального конъюнктивита.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 38 пациентов (48 глаз) в возрасте от 17 до 62 лет, среди них женщин – 18, мужчин – 20. Больные были разделены на 2 группы. Пациенты первой группы (основная – 18 больных (24 глаза)) – антибактериальный препарат «Флоксал» в комбинации с серосодержащим препаратом «Факовит»; пациенты второй группы (сравнения – 20 больных (24 глаза)) – получали только традиционно применяемые средства. Больные обеих групп были сопоставимы по полу,

по возрасту и характеру клинических проявлений заболеваний. Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование (визометрия, биомикроскопия). Перед началом лечения проведен бактериологический посев содержимого конъюнктивальной полости и контроль бактериологического результата через 7 дней. Сравнительная оценка эффективности лечения в обеих группах проводилась на основании ликвидации воспалительной реакции, которая определялась модифицированным тестом Draize, сокращение сроков лечения.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проводимого лечения у больных группы сравнения при средней степени воспаления показатели купирования признаков воспалительной реакции составили – 3,5 суток, а в основной – 2,5 суток. При высокой степени воспаления в группе сравнения оценка купирования признаков заболевания составила – 10 суток, а в основной – 7 суток. В условиях применения «Факовит» сроки исчезновения отделяемого у больных конъюнктивитом при средней степени воспаления составили 1,5 суток, в то время как при традиционном лечении – 2,5 суток, при этом показатели среднего ранга составили 21,41 и 11,59 соответственно. При высокой степени воспаления в группе с применением «Факовит» сроки исчезновения отделяемого составили около 3,5 суток, а без применения препарата – 5,5 суток.

Вывод. Таким образом, применение препарата «Факовит» в комплексном лечении острого бактериального конъюнктивита позволяет повысить эффективность медикаментозного лечения, что выражается в снижении показателей степени воспалительного процесса, времени купирования признаков воспалительной реакции. Назначение серосодержащего препарата «Факовит» является безопас-

ным, а его терапевтическая активность и отсутствие токсического действия, дают основа-

ние для рекомендации применения этого препарата в офтальмологической практике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Егоров А. Е. Лечение острого бактериального конъюнктивита // Клиническая офтальмология. – 2000. – № 2. – С. 57-58.
2. Майчук Ю. Ф. Аллергические заболевания глаз // Русский медиц. журнал. – 1999. – № 1. – С. 20-22.
3. Полунин Г. С., Макаров И. А. Новые ле-

карств. препараты // Вестник офтальмол. – 1997. №. – С. 12-14.

4. Рязанцев С. В. Иммунология // Новости отоларингологии и лорopatологии. 1999. – № 2.– С. 112-114.

5. Хаитов Р. М., Игнатъева Г. А., Сидорович И. Г. Острый бактериальный конъюнктивит // Окулист. – 2000. № 11/12. – С. 11.

А. М. Петруня, О. В. Селіванова,
Г. В. Степаненко, В. Ф. Явтушенко
РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУ-
ВАННЯ ГОСТРОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО
КОН'ЮНКТИВІТУ

м. Луганськ, Україна

Резюме. Результати комплексного лікування 38 пацієнтів з бактеріальним кон'юнктивітом, дозволили встановити, що комплексна програма лікування, що включає вдосконалення оцінки тяжкості запального процесу, розробка об'єктивних критеріїв застосування лікування в комплексній терапії препарату «Факовіт» (18 хворих) дозволило знизити час купування ознак запальної реакції, зниження термінів непрацездатності.

Ключові слова: бактеріальний кон'юнктивіт, медикаментозне лікування, флоксал, факовіт.

A. M. Petrunya, O. V. Selivanova,
G. V. Stepanenko, V. F. Yavtushenko
COMPLEX TREATMENT RESULTS OF
ACUTE BACTERIAL CONJUNCTIVITIS
Lugansk, Ukraine

Summary. Results of complex treatment of 38 patients with bacterial conjunctivitis, have allowed to establish that the complex program of treatment including improvement of an estimation of severity of inflammatory process, working out of objective criteria of using treatment, application in complex therapy of the drug «Phakovit» (18 patients) has allowed to lower time of knocking over of sings of inflammatory reaction, to reduce disability terms.

Key words: bacterial conjunctivitis, medicinal treatment, floksal, facovit.